

兒童醫學部

紅鳩

醫檢師 涂允昭

紅鳩

英文名：Red Turtle Dove

學名：*Streptopelia tranquebarica*

分類上屬於鴿形目（Columbiformes），鳩鴿科（Columbidae），或名火斑鳩或紅斑鳩，閩南語又名：紅斑鳩、火雞，客語：哺咕仔。是一種小型的鳩鴿科斑鳩屬鳥類，主要分布於北緯10度以北的副熱帶與熱帶季風亞洲，常見於平原、草地或農地旁（圖一）成群覓食。分布於印度、尼泊爾、不丹、孟加拉、緬甸、中南半島、臺灣、菲律賓以及中國等地。

型態：紅鳩，體長約23公分，是鳩鴿科中體形較小的一種。嘴喙短細且呈灰黑色，尖端為鉤狀，頭小，雄鳥頭部至頸部為鐵灰色帶狀區，後頸部有一條黑色帶的頸環，或兼夾白色細斑，背、胸至腹部的羽毛呈磚紅色，尾下覆羽為白色（圖二）。紅鳩的雌雄體型相似，但雌鳥的後頸環為灰黑色；頸環外緣有白色，背、肩羽褐色較濃，不若雄鳥的磚紅色，腹面羽色為較淡的灰褐色（圖三）。腿部為深灰色或灰褐色。

生態：紅鳩性喜群棲，飛行迅速，常見於地面上行走，啄食。主要以植物果實、種子為食。在低海拔樹林、公園、田邊、荒草地上皆可見。紅鳩的數量是台灣鳩鴿科鳥類中最多的一種。牠們是群居的鳥兒，每年田間農作物收割的時刻，不管曠野、樹枝或電線處常會看到牠們上百成千的棲息蹤影（圖四）。紅鳩飛翔時的姿態十分凌亂，讓人有橫衝直撞拼命三郎的感覺。



圖一：紅鳩於農地旁



圖二：紅鳩公鳥特徵



圖三：紅鳩母鳥特徵



圖四：配對中的紅鳩