

回服液劑如何安全使用?

藥師毛志民

取用正確劑量是使用口服液劑最關鍵的步驟,尤其是小朋友。因此,不要使用湯匙或茶匙,使用以毫升為單位的器具測量藥品才精確。

懷孕哺乳婦女選用含草藥食品的考量

含草藥食品包含可同時提供食品使用之中藥材,坊間產品玲瑯滿目,對於懷孕和哺乳婦 女而言,若有選用需求時,有哪些需要考量的?

草藥中所含成分含量可能會受到種植區域、季節等因素而不同,且因為是食品,成分含量的純度及一致性無須受藥政機關監管,換言之,若成分含量不一,所預期的效果自然也難以確定。

再者,僅有少數含草藥食品(或其特定的活性化合物)針對對懷孕和哺乳期的安全性執行過嚴謹的科學研究;包括任何已知或未知的產品成分,可能與正使用的藥品發生相互作用;如果食品內含酒精,懷孕期間應避免選用。還有必需排除鉛和汞等金屬、殺蟲劑、化學品、細菌或其他微生物汙染物疑慮。

準媽咪。那些藥您碰不得!

對於準備懷孕或是懷孕的婦女而言,關心正服用的藥物是否會對胎兒有不利影響,尤其 是胎兒器官發育的胚胎期,凡經證實對人類具畸胎性的藥品,在說明書上會清楚地呈現,另 例舉如下:

- 1.抗微生物製劑:如四環素類、氟化恩菎類抗生素(fluoroquinolones)影響骨骼發育。
- 2.抗凝血劑:如「華法林」(warfarin) 導致骨骼及中樞神經缺陷。
- 3.防止抽搐的抗癲癇藥,包括「卡馬西平」(carbamazepine),「拉莫三嗪」(lamotrigine),「苯巴比妥」(phenobarbital),「苯妥英」(phenytoin),「托吡酯」(topiramate),「丙戊酸」(valproate)可能導致神經管缺陷等先天畸形。
- 4.治療甲狀腺機能亢進的藥物:如「普樂治」(propylthiouracil)造成胎兒和新生兒甲狀腺腫、甲狀腺素低下。
- 5.治療青春痘的「異維A酸」(isotretinoin)會造成威脅胎兒生命的缺陷,因此連服此藥期間都不可以捐血,避開輸血給孕婦的可能性。
- 6.荷爾蒙藥物:如男性雄性激素可能導致胎兒雄性化。

提醒您,準媽媽不可擅自用藥,若須藥物治療,請詢問醫師或藥師,弄清楚所服用藥物 對自己身體及腹中胎兒的影響,以避免憾事發生。