

藥學部

關於 公費流感疫苗 您需要知道的事

藥師 毛志民

疾病管制署(疾管署)規劃今年10月1日起分階段開打的公費流感疫苗，諸如50歲以上成人、安養/養護/長期照顧等機構對象、罕見疾病及重大傷病患者、高風險慢性病人及BMI \geq 30者、年滿6個月以上至國小入學前幼童、國小至高中/職學生、醫事防疫人員、禽畜養殖業者及動物防疫人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、孕婦及6個月內嬰兒之父母等屬感染流感後容易併發重症及容易傳播流感病毒的族群，即為公費疫苗接種對象。

每年流感疫苗組成病毒株有所差異，且所接種流感疫苗之保護效果於6個月後會逐漸下降，為能於新來臨之流感流行期可獲得足夠保護力，建議仍需接種當季流感疫苗。四價流感疫苗依據世界衛生組織每年對北半球建議更新，適用於2021-2022年流行季，包含4種不活化病毒株，即2種A型（H1N1及H3N2）及2種B型（Victoria及Yamagata）。

疾管署採購3家廠牌公費流感疫苗計611萬1310劑，各廠牌的疫苗雖然製程略有不同，但所含病毒之抗原性相似，其效果一樣，亦無安全之慮，若需接種2劑之兒童，2劑可接種不同廠牌疫苗；民眾接種公費流感疫苗之廠牌將依對象採「隨機」安排方式，無法指定廠牌，各廠牌適用年齡如下：

流感疫苗是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。經110年8月28日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組決議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天。

接種流感疫苗後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等全身性的輕微反應，一般會在發生後1-2天內自然恢復。嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），發生機率非常低，若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀；為了能在立即型過敏反應發生後立即進行醫療處置，接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘以上，待無不適後再離開。

流感疫苗之保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達30-80%，施打流感疫苗有助於提高對流感病毒的防護與重症保護力。

參考資料：疾管署。
年度流感疫苗接種計畫。
<https://reurl.cc/q1g20p>



持有許可證廠商 / 品名	劑型	適用年齡
賽諾菲股份有限公司 / Vaxigrip Tetra 巴斯德四價流感疫苗	0.5mL	提供 6 個月以上使用
國光生物科技股份有限公司 / AdimFlu-S(QIS) “安定伏” 裂解型四價流感疫苗	0.5mL	提供 3 歲以上使用
台灣東洋藥品工業股份有限公司 / FLUCELVAX QUAD 輔流威適流感疫苗	0.5mL	提供 3 歲以上使用