

藥物過敏史 務必告知醫師

知名歌手日前於臉書披露愛妻服藥過敏，感到呼吸困難，經急送醫後幸無大礙的消息。您如果看過藥品說明書，一定會發現「對此成分過敏者避免服用」之類的提醒文句，也就是未曾接觸過此成分的人，有可能會有出現藥物過敏反應。

「藥物過敏」指得是藥物經由口服或注射等方式進入身體後，引發免疫反應以致出現過敏症狀，可能在使用後一小時內發生立即反應，也可能用藥數天或數個月後才出現延遲反應。

「全身型過敏性反應」是一種由接觸藥物、食物及昆蟲螫刺等過敏原快速引發的立即性過敏反應，早期常見皮膚紅疹搔癢感，喘鳴和胸部緊繃，到血壓過低而昏厥，施打此類藥品須謹慎地監控病人的過敏反應徵兆及症狀，需有急救設備備用，注射後半小時內應有人監控病人確保安全。

針對延遲藥物過敏反應，用藥期間注意藥物過敏前兆—「疹」（皮膚紅疹、搔癢或水泡）、「破」（口腔潰爛）、「痛」（喉嚨痛）、「紅」（眼睛不適如：紅腫、灼熱）、「腫」（嘴唇腫）、「燒」（發燒）等現象，若出現一個以上症狀，請立即回診，並告知醫師正在使用的藥物。

每年死亡通報案件經全國藥物不良反應通報中心經初步評估後，會篩選具潛在安全訊號意義之案件進行綜合分析，再提交食品藥物管理署藥品安全評估諮議小組委員會議討論，提供主管機關行政參考建議，並針對議題與醫療人員及使用者進行適當的溝通。109年度便發布風險溝通表提醒臨床醫療人員及民眾注意 cyclosporin注射劑型(高藥品

項商品名為「生體睦」、「因睦寧」和「新體睦」)具有潛在危及生命之嚴重過敏反應風險，並應監測病人臨床情況並備妥急救措施；含 ertapenem 成分藥品(高藥品項商品名為「益滿治」)之中文仿單應於「副作用」處加刊「史蒂文生氏 - 強森症後群及毒性表皮壞死溶解症」。

在高雄榮總就診，當您告訴醫師您曾經對哪些藥物過敏、或是因為服藥正發生過敏反應的時候，醫師將藥名或其藥物分類輸入電腦。只要您在本院就診，就算是由不同的醫師為您看病，電腦也會提醒醫師注意；對於曾引起過敏性休克、史蒂文生氏 - 強森症後群、毒性表皮壞死溶解症和血管性水腫等嚴重的藥物反應的藥品，更是依據系統設定直接攔阻、無法開立，以確保民眾用藥安全。

若您有藥物過敏史，務必記錄藥名，請醫師註記於健保IC卡並善用健康存摺，就醫時除了健保卡，也隨身攜帶藥物過敏記錄卡，務必記得提醒醫師留意。

