

紅嘴黑鶇

紅嘴黑鶇，英文名：Black Bulbul；學名：Hypsipetes leucocephalus，是雀形目（Passeriformes）鶇科（Pycnonotidae）的一種鳥類，分布範圍主要在東洋界的大陸地區，西起喜馬拉雅山脈西緣，經中國南方廣大地區，東迄臺灣，南抵中南半島南部。在分佈廣大的地區中有數種亞種，大部份都只是身體羽色的差異所造成（圖一）。

在布農族的神話傳說中有提到一種叫做 haipis 的鳥兒，就是紅嘴黑鶇，傳說在遠古的時代，牠們替族人帶回火種（被火種灼傷，所以才嘴紅、腳紅），讓族人度過洪水危機，可說是幫助族人存活的大功臣（圖二）。

型態：紅嘴黑鶇身長約24至25公分，尾羽略長，全身羽毛呈黑色，初級飛羽則有些灰色，雌雄同色且外型相似。嘴喙和腳脛為紅色，頭部則帶有黑色的蓬鬆冠羽（圖三）。亞成鳥無黑色鬆冠羽。

生態：紅嘴黑鶇的食物有種子和昆蟲，經常成群或棲或飛尋找食物，特別喜歡吃莓果（圖四）。紅嘴黑鶇相當喧鬧，常發出大聲的「喵—、喵—」的貓叫聲或「小氣鬼、小氣鬼」或「噦--喳、噦--喳」叫聲，多出現於闊葉林和耕地區，築巢於樹木或灌木，一鳥窩有2至4個蛋。紅嘴黑鶇有一項奇妙的習性，冬季氣溫降低時，許多鳥兒會往較低海拔處移動，到比較溫暖的地方過冬，可是紅嘴黑鶇卻反而有往較高海拔處移動的傾向。這種現象稱作「反降遷」，可能是為了要進駐其他鳥類降遷避冬之後空下的棲息空間，當其他鳥兒變少了，相對來說取得食物的機會便會增加，紅嘴黑鶇也就能在冬天的山上大快朵頤。




圖一：紅嘴黑鶇身體羽色的特徵



圖二：像被燙傷嘴紅、腳紅的紅嘴黑鶇



圖三：紅嘴黑鶇有黑色的蓬鬆冠羽



圖四：喜歡吃莓果的紅嘴黑鶇