

## 1-1 抗高血壓用藥及心血管用藥 (鈣離子阻斷劑)

學名	商品名	中文商品名	含量
Amlodipine	Amcopine	壓可平錠	10 毫克/錠
Amlodipine	Norvasc	脈優錠	5 毫克/錠
Amlodipine	Nobar	諾怡錠	5 毫克/錠
Amlodipine /Atorvastatin	Caduet	脂脈優錠	Amlodipine 5 毫克/ Atorvastatin 10 毫克
Amlodipine /Benazepril	Amtrel	諾壓錠	Amlodipine 5 毫克/ Benazepril 10 毫克
Amlodipine /Olmesartan	Sevikar	舒脈康膜衣錠	Amlodipine 5 毫克/ Olmesartan 20 毫克
Benidipine	Coniel	康你爾膜衣錠	4 毫克/錠
Enalapril/Felodipine	Feloen	菲洛安持續性藥 效錠	Enalapril 5 毫克/ Felodipine 5 毫克
Diltiazem	Hesor	優爽錠	60 毫克/錠
Diltiazem	Cardizem Retard	凱帝心錠	90 毫克/錠
Nifedipine	Atanaal	壓達能軟膠囊	5 毫克/錠
Nifedipine	Adalat OROS	冠達悅歐樂持 續錠	30 毫克/錠
Nifedipine	Nifedipine SRFC	恆脈循持續性 膜衣錠	30 毫克/錠

Valsartan /Amlodipine	Exforge	易安穩	Amlodipine 5 毫克 /Valsartan 80 毫克
Valsartan /Amlodipine/ Hydrochlorothiazide	Exforge HCT	力安穩	Amlodipine 5 毫克 /Valsartan 80 毫克 /Hydrochlorothiazide 25 毫克
Verapamil	Isomil	依索蜜錠	40 毫克/錠

### 作用：

此類藥可用於治療高血壓及心絞痛。

使用本藥之前，有下類狀況應告知醫師：

1. 曾經對此類藥有過敏反應者。
2. 已懷孕或打算要懷孕或正在哺乳的婦女
3. 肝功能不佳或心臟衰竭者
4. 已知有心臟疾病，如主動脈瓣、僧帽瓣狹窄之患者。

### 正確服藥的方法及注意事項：

1. 遵守醫師的指示，按時服藥，不可隨意增減藥量。
2. 除 Atanaal cap 為短效膠囊，飯前或飯中整粒吞服；緊急時可咬破膠囊，含於口中或舌下。

Adalat OROS Tab、Nifecardia SR、Cardizem Retard 為長效持續錠。以適當冷開水整粒吞服、不可剝半或咬碎亦不可研磨成粉以防失去持續藥效。Amlodipine(脈優錠)為白色長效錠，可剝半及咬碎服用。

3. 避免與高脂肪性食物、酒及葡萄柚汁併服。
4. 藥品勿儲存於避光陰涼之處，服用時再從錫箔取出藥品，立即服用。
5. 長期服用，避免突然停藥，應依醫囑慢慢減量至停藥。
6. 下列藥品可能會影響鈣離子阻斷劑的作用，如有使用時，請告知醫師：
  - 抗癲癇藥：Phenytoin、Carbamazepine
  - 抗結核病藥：Rifampin、Isoniazid
  - 巴比妥類鎮靜劑等會降低鈣離子阻斷劑的作用。
  - 紅黴素、Cimetidine、Quinidine、葡萄柚汁等會增加鈣離子阻斷劑的作用。

副作用：

1. 噁心、嘔吐、便秘或腹瀉、食慾不振、肌肉無力感等。
2. 更常見頭痛、顏面發紅。血壓下降、下之浮腫、頭暈、眼花撩亂、感覺悶熱、疲倦等。
3. 長期使用，可能有牙齦腫大。
4. 若有下列情形，應告知醫師：胸痛、不規則心跳、皮膚紅疹、腳裸腫脹、呼吸困難或氣喘。

如果你還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，說明你的姓名、病歷號、電話、藥袋上藥品名及日期、以便回覆。祝您早日康復

高雄榮民總醫院屏東分院藥劑科 謹製

服務電話：(08)7704115 轉 738、740 門診藥局

轉 743 住院藥局

轉 312 急診藥局

104/03/23 修訂