

1-2

甲 1 型－腎上腺素阻斷劑 (α1－Blockers) (降血壓或泌尿用藥)

學名	商品名	中文名	含量
Alfuzosin	Lafuzo XL	列優治持續藥效錠	10 毫克/錠
Doxazosin	Dophilin	道福寧錠	2 毫克/錠
	Doxaben XL	可迅持續性藥效錠	4 毫克/錠
Silodosin	Urief	優列扶膠囊	4 毫克/顆
Tamsulosin	Tamso SR	替你坦舒持續釋放膠囊	0.2 毫克/錠
	Harnalidge D	活路利淨 D 口溶錠	0.2 毫克/錠
Terazosin	Terazosin	替你舒壓錠	2 毫克/錠

作用：

此類藥品可使血管擴張，幫助血流順暢，因此常用於降血壓。臨床上可用於減少膀胱及輸尿管之排尿阻力，因此用於治療攝護腺肥大。

正確服藥及注意事項：

1. 開始服用本藥前，若有下列情況請告知醫師或藥師：
 - 曾經對此類藥有過敏反應者。

- 目前正在服用其他藥品（包括指示用藥與成藥）。
 - 女性患者懷孕、計畫懷孕或親自授乳。
 - 有肝、腎臟病。
2. 請依藥袋上醫師的指示，按時服藥。千萬不可任意增減劑量或擅自停藥。
 3. 第一次服用時可能會感到想睡、暈眩。因此服用後要躺下至少一小時，起身時動作也要緩慢。不要開車及做危險的動作直到您習慣此藥對您的影響。
 4. 記得按時測量血壓及定時回診。
 5. 請隨時確認您身邊的藥量是否足夠，尤其在假日前或長途旅行前。
 6. 運動及飲食方面（如：低鈉食物）的注意事項，請遵照醫師指示。服藥期間，避免喝酒。
 7. 服藥期間若接受外科手術（包括牙科手術），請事先告知醫師您正在服用此藥。
 8. 忘記服藥時怎麼辦？當您想起來時馬上補服一次量，但是若和下次用藥時間接近，則省略本次用藥。千萬不可一次服用兩倍的劑量。
 9. 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫乾燥處、避光保存，避免放在小孩可以取得的場所。
 10. **Lafuzo XL、Doxaben XL、Tamso SR 應整粒吞服，不可咬碎、剝半或磨粉。Tamso 膠囊 亦應整粒吞服，不可打開膠囊。**

副作用

1. 可能發生的副作用：

- 想睡、頭痛、虛弱、心悸。
- 眩暈、噁心、胃痛。
- 關節肌肉痛、疲倦。

2. 若您有下列副作用，應儘快告知醫師：

- 過敏反應
- 胸痛、呼吸急促、突然昏倒。

如果你還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，說明你的姓名、病歷號、電話、藥袋上藥品名及日期，以便回復。祝您早日康復

高雄榮民總醫院屏東分院藥劑科 謹製

服務電話：(08)7704115 轉 738、740 門診藥局

轉 743 住院藥局

轉 312 急診藥局

103/10/15 修訂