

## 1-3

# 乙型腎上腺素性阻斷 ( $\beta$ -Blockers)

## (降血壓或心臟用藥)

學名	商品名	中文名	含量
Atenolol	Mirobect	脈樂必克膜衣錠	50 毫克/錠
Bisoprolol	Concor	康肯錠	5 毫克/錠
Carvedilol	Syntrend	心全錠	6.25 毫克/錠
	Dilatrend	達利全錠	25 毫克/錠
Labetalol	Trandate	湍泰低錠	200 毫克/錠
Propranolol	Cardolol	心康樂錠	10 毫克/錠

### 作用：

最常見的作用是控制高血壓、心律不整及預防心絞痛。Propranolol 尚可用於預防偏頭痛。上述慢性病須長期按時服用，才能確保療效。除此外，因藥理作用關係，這類藥品也可能用於其他疾病的治療，必要時請和您的醫師或藥師討論。

### 用法：

1 上述藥品因藥效長短不一，每日服用次數及每次劑量，請遵照藥袋上的指示服用。

下列情形時，請事先告知醫師：

1. 曾對此藥過敏；懷孕、授乳期；有心臟、腎臟或肝臟等疾病；或有氣喘、氣管炎、肺氣腫等；或糖尿病，甲狀腺機能亢進。
2. 您目前正在服用的藥物，尤其是心臟病、高血壓、糖尿病、偏

頭痛、精神病、氣喘、過敏或感冒的藥品。

### 正確服藥及注意事項：

1. 定期回診，使醫師能了解您用此藥的效果。
2. 每天定時量脈搏及血壓，若低於醫師所訂定的標準，請馬上與醫師聯繫，再決定今天是否服藥。
3. 身邊要維持足夠的藥量，尤其在假日或長途旅行之前，藥量須先補足。
4. 請配合低鈉、低鹽飲食及適當運動並且戒煙、戒酒。
5. 服藥期間可能造成頭暈，盡量避免長途開車及操作危險器械。
6. 因突然停藥可能會導致病情惡化，未經醫師許可請勿擅自停藥。
7. 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫乾燥處、避光保存，避免放在小孩可以取得的場所。

### 副作用

1. 頭暈、疲倦、腳痛、噁心、頭痛、咳嗽、腹瀉、便秘。
2. 手腳冰冷、睡眠不好、惡夢、精神異常。
3. 呼吸困難、哮喘、下肢水腫、胸痛、脈搏變慢或不規則、昏倒。

忘了服藥時怎麼辦？

想起來時馬上補服，但是若和下次用藥時間接近，則省略本次用藥。千萬不可一次服用兩次的劑量。

如果你還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，說明

你的姓名、病歷號、電話、藥袋上藥品名及日期，以便回復。祝您  
早日康復

高雄榮民總醫院屏東分院藥劑科 謹製

服務電話：(08)7704115 轉 738、740 門診藥局

轉 743 住院藥局

轉 312 急診藥局

103/10/15 修訂