

# 1-4

## 血管收縮素 II 拮抗劑

### (Angiotension II Antagonists)

學名	商品名	中文商品名	含量
Amlodipine /Olmesartan	Sevikar	舒脈康膜衣錠	Amlodipine 5 毫克 /Olmesartan 20 毫克
Candesartan	Blopress	博脈舒錠	16 毫克/錠
Candesartan/ Hydrochlorothiazide	Blopress PLUS	博脈舒加強錠	Candesartan 16 毫克/ Hydrochlorothiazide 12.5 毫克
Candesartan/ Amlodipine	Unisia	優雅錠	Candesartan 8 毫克/ Amlodipine 5 毫克
Losartan/ Hydrochlorothiazide	Hysartan	壓寧悅錠	Losartan Potassium 50 毫克 /Hydrochlorothiazide 12.5 毫克
Valsartan	Diovan	得安穩	160 毫克/錠
	Valsart	舒心樂	
Valsartan /Amlodipine/ Hydrochlorothiazide	Exforge HCT	力安穩	Amlodipine 5 毫克 /Valsartan 80 毫克 /Hydrochlorothiazide 25 毫克
Valsartan/ Hydrochlorothiazide	Co-Diovan	可得安穩膜衣錠	Valsartan 80 毫克 /Hydrochlorothiazide 12.5 毫克
Valsartan/Amlodipine	Exforge	易安穩	Valsartan 80 毫克 /Amlodipine 5 毫克

Losartan	Losartan	那寶膜衣錠	50 毫克/錠
----------	----------	-------	---------

#### 作用：

治療高血壓、心衰竭

#### 用法：

1. 請遵照藥袋上的用法服用，勿自行停藥。
2. 通常每天服用一次，必要時依醫師指示可增為每天二次。
3. 空腹或飯後服用均可。

#### 注意事項：

1. 在服用本藥前，如有使用其他藥品，如利尿劑、降血壓藥、成藥等，請先告知醫師。
2. 已懷孕或預備懷孕，請先告知醫師。
3. 肝、腎、心臟功能不全患者請先告知醫師。
4. 可能導致嗜睡、頭痛、暈眩等副作用，開車或操作機械時要小心
5. 經成食用含鉀代鹽(如低鈉鹽)，可能會引起血鉀升高，產生心跳不規則、呼吸急促、全身無力、噁心嘔吐等症狀。
6. 必須按時回診，定期量血壓及作相關檢查，以確定您對此藥的反應。
7. 身邊要維持足夠的藥量，尤其在假日或長時間旅行之前，藥量須先補足。

忘記服藥時該怎麼辦？

如果忘記服藥，想起時儘快服用。但如果想起時剛好是下次的服藥時間，則不補服，依照原來時間服用下一次的劑量即可，絕不可一次服用雙倍計量。

#### 副作用

- 頭痛，頭暈，睡眠障礙，疲倦，鼻塞，腹瀉，腹部不適，肌肉痛或抽筋，關節痛。
- 咳嗽、頭暈、頭昏眼花、特別是由床上或椅子上坐起時、低血壓、高血鉀
- 若有皮膚過敏反應，應停藥並告知醫師。

藥品該如何存放？

請連同藥代儲存於緊密容器內，於室溫、乾燥處、避光保存，避免放在孩童可以取得的場所。

如果你還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，說明你的姓名、病歷號、電話、藥袋上藥品名及日期，以便回復。祝您早日康復

高雄榮民總醫院屏東分院藥劑科 謹製  
服務電話：(08)7704115 轉 738、740 門診藥局  
轉 743 住院藥局  
轉 312 急診藥局

103/10/15 修訂