

3-2

非類固醇消炎止痛藥(NSAID)

學名	商品名	中文商品名	含量
Celecoxib	Celebrex	希樂葆膠囊	200 毫克/顆
	Cecolex	希骨樂膠囊	200 毫克/顆
Diclofenac	Voren E.M.	非炎腸溶微粒膠囊	50 毫克/顆
Flurbiprofen	Lefenine	利菲炎錠	100 毫克/錠
Meloxicam	Mopik	莫比克錠	7.5 毫克/錠
Naproxen	Genuproxin	百炎錠	250 毫克/錠
Sulindac	Suloril	速樂利錠	200 毫克/錠

【作用】

此類藥為非類固醇的消炎止痛藥，主要用於止痛、消除發炎症狀。

【正確服藥及儲存方法】

1. 遵守醫師的指示，按時服藥，不可任意增減藥量。
2. 忘記服藥，儘快補服，若已接近下次服藥時間，就不必補服，切記不可服兩倍量。
3. 藥品儲存於室溫、避光、乾燥陰涼之緊密容器內。
4. 請維持藥品原來的包裝，避免放置兒童可以拿到的地方。

【注意事項】

1. 如果您對此藥、曾經對阿斯匹林 (Aspirin) 或對其他非類固醇抗發炎藥物

(NSAIDs)有過敏經驗，包括：嘴唇或眼睛腫脹、皮膚紅疹、搔癢、呼吸急促或呼吸困難等，請務必先告知您的醫師。

2. 如果您有下列疾病，服藥前請先告訴您的醫師：過敏、消化性潰瘍、胃出血或其他腸胃道疾病、氣喘、高血壓或其他心臟疾病、肝臟或腎臟疾病、紅斑性狼瘡、血液異常疾病等。
3. 告知您的醫師或藥師您正在服用的藥品，尤其是抗凝血劑 (Warfarin)、阿斯匹林 (Aspirin)、其他非類固醇抗發炎藥物 (NSAIDs)、乙型交感神經阻斷劑 (Atenolol、Labetalol 等)、抗排斥藥物 (Cyclosporin)、利尿劑、促進尿酸排泄藥 (Probenecid)、抗癌藥物 (Methotrexate)、成藥 (感冒藥)、中藥、維他命等。
4. 如果您需長期使用非類固醇止痛消炎藥，請定期監測肝、腎功能與糞便潛血反應。
5. 建議服藥期間不要飲用含酒精飲品，因酒精易引起頭痛、胃出血的副作用產生。
6. 如果您準備懷孕或已經懷孕或需餵哺母乳，請告知您的醫師或藥師。
7. 如果您欲接受手術或拔牙時，請告知您的醫師您正在服用此藥。
8. 避免不必要或長期日曬，並做好防曬措施，因此類藥物可能會產生光敏感的副作用。

【副作用】

1. 頭暈或暈眩、胃部不適、腹脹、皮膚出疹、腹瀉或便秘等。
2. 發生下列症狀時，請馬上和醫師聯絡：異常疲倦或頭暈、頭昏眼花、嚴重腹部或胃灼熱或絞痛、食慾不振、噁心或嘔吐、吐血、黑便或血便、耳鳴、四肢水腫、眼睛或皮膚變黃等。

如果你還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，說明你的姓名、病歷號、電話、藥袋上藥品名及日期、以便回覆。祝您早日康復高雄榮民總醫院屏東分院藥劑科 謹製

服務電話：(08)7704115 轉 738、740 門診藥局
轉 743 住院藥局
轉 312 急診藥局