

## 住院醫師於 SARS 流行期間介入性檢查注意事項

1. 有發燒或有接觸史的病人(一般會在帳棚區)先確定感染科看過病人；我們自己最好調病人的 Order, CXR 或 CT 看看。
2. 若已排除 SARS，請最少著以下防護裝備
  - > N95+surgical mask
  - >綠色手術衣
  - >頭套
  - >手套 x2
3. 若不能排除 SARS 或診斷為 SARS，請進行以下防護裝備
  - >上列裝備，但是手套 x2，頭套 x2
  - >防水隔離衣（穿在最外面）
  - >臉罩（尤其病人有咳嗽）
  - >眼罩(選配)

叫病人前要請開單單位通知清潔工待命，穿著順序與檢查流程請參照[這裡](#)。
4. 超音波導引檢查請固定在 15 室，血管攝影在舊機做。超音波檢查完，衣物與拋棄式衛材要分開裝在兩個黃色塑膠袋：
  - Ø 裝完衣物後，請再套入一白色布袋內。
  - Ø 拋棄式衛材
    - > 針頭、刀、穿刺針、針筒請丟在原來該丟的地方。
    - > 頭套、手套、臉罩、眼罩、隔離衣、wire、dilator 和紗布等則丟入另一黃色塑膠袋中，綁起來。
5. 鍵盤必須以保鮮膜覆蓋、probe 必須以手套包起來、就算只有做超音波檢查而已也是如此。若做到需高/中度警覺的患者(參照[這裡](#))，probe 的手套請務必要換掉，等房間消毒完再繼續做病人。
6. 做需高/中度警覺的患者時，請務必要求有家屬或隨行人員在檢查室外面等候。萬一你被病人體液污染，請叫家屬或隨行人員進來看著病人，你應該馬上洗澡，換上一套新的隔離衣物再繼續做病人。洗澡的地方如果不知道，請跟我(陳炯毓)聯絡。
7. 原則上需高/中度警覺的患者盡量不要晚上值班做 procedure，這是本科共識。

2003/5/29 1<sup>st</sup> edition