

甲狀腺細針穿刺抽取細胞學檢查 注意事項



高質服務
雄心創新
榮耀生命
總歸愛心

檢查步驟

1. 我們將請您平躺在治療台上，肩下墊一枕頭，使頭部後仰及頸部伸張，先用超音波檢查甲狀腺。
2. 若有異常，會先找出病灶位置，再用細針穿刺抽取一些細胞或液體，送病理檢驗部化驗。
3. 下針時會有疼痛的感覺，此時請正常呼吸不要憋氣，勿吞口水、說話或亂動以免危險。
4. 抽完後請用棉球用壓迫止血至少20分鐘，直到不再出血才能拿掉棉球離開候診區，之後傷口請保持乾淨。

檢查前

1. 若您對酒精過敏，請務必告知醫師。
2. 請詳閱檢查說明書並填妥同意書。
3. 請勿穿著高領衣物並將頸部飾物取下。
4. 若服用抗凝血藥物、抗血小板藥物或健康食品者須停用：

藥品	建議停藥天數
Aspirin	7~10天
Clopidogrel、Ticagrelor、Warfarin	5天
Dabigatran	4天
NOAC(novel oral anticoagulants)、Rivaroxaban Apixaban、Cilostazol、Edoxaban	1~2天
健康食品(如:銀杏)	7天

5. 若行動不便、高齡、檢查中無法配合醫師指示、無法自行壓緊穿刺傷口者，務必請家屬陪同。

檢查中

1. 請配合醫師指示：平躺、頭部微仰、勿任意更換姿勢。
2. 如須行甲狀腺穿刺，下針時請正常呼吸不要憋氣，勿吞口水、說話或亂動。

檢查後

1. 穿刺後請壓緊至少20分鐘，確認無出血或不適情況再離開。
2. 回家後若有患處腫脹或呼吸困難，請立即至急診處掛號就醫。
3. 請於檢查後10個工作天，自行預約掛門診或依醫師原預約門診時間看檢查結果。
4. 離開前，請記得帶走您的隨身物品。

您的健康，我們來守護！！

新陳代謝科 關心您