

BR-MA簡介

Immulite BR-MA用來偵測血清的CA-153抗原,CA-153是一種高分子量的表皮細胞粘蛋白,分子具多變性(分子量300-450 KD).血清中CA-153的量與乳癌的stage有關,乳癌發生轉移時會出現最高量.CA-153用來偵測乳癌比CEA更專一和敏感,CA-153在懷孕期並不會上升,且乳房良性病變時陽性率較低.乳癌病人有98%可見到CA-153的上升,同時在肺癌(63%)及卵巢癌(80%)的病人也可見到CA-153的上升.

IMMULITE BR-MA資料

Working Range : 1-300U/mL

Assay Time : 70 min

校正週期 : 2 weeks

參考值 : 9-51 U/mL

Sample Volume : 5 uL serum

Sample Dilution : 檢體濃度超過300 U/mL需使用BR-MA專用的Diluent,Diluent

可存於2-8°C 30天,或分裝存於-20 °C可延長使用期限.

檢體收集及保存 : 檢體可保存於2-8°C 1天,或-20°C 二個月.

Adjustor : Low和 High各一瓶,粉末狀,使用前加入3 mL Distilled water,
分裝保存於-20°C.

Reagent : 6.5 mL,分A,B各一瓶,請保存於2-8°C.

Test unit : 請保存於2-8°C,使用前務必回溫方能開封,使用後務必封口回
存冰箱.