

高雄市立聯合醫院 常備胰島素品項

類型/外觀	藥品名	商品名	規格	藥物動力學			儲存方式	
				Onset	peak	duration	未開封	開封後
速效型								
速效/澄清液	Insulin aspart	FlexPen NovoRapid 諾和瑞諾易筆	300 IU/3 ml	10-20 分鐘	1-3 小時	3-5 小時	2-8°C	30°C 以下 四星期
速效/澄清液	Regular Human Insulin(RI)	Humulin R 優泌林- 常規型人體胰島素	10 ml/vial	30-60 分鐘	2-3 小時	3-6 小時	2-8°C	30°C 以下 四星期
中~長效型								
中效/懸浮液	NPH human insulin recombinant DNA origin	Humulin N 1000IU 優泌林—中效型 (NPH 型人體胰島素 (基因重組) 懸液)	10ml/vial	1.5	小時	4-12	2-8°C	30°C 以下 四星期
長效筆型/澄清液	Insulin detemir	Levemir Flexpen 瑞和密爾諾易筆	300 IU/3 ml /pen	3-4 小時	6-8 小時	24 小時	2-8°C	30°C 以下 六星期
長效筆型/澄清液	Insulin glargine	Toujeo® 糖德仕注射劑	300 IU/mL, 1.5 mL	6 小時	12-16 小時	36 小時	2-8°C	30°C 以下 42天
混合型								
速-中效筆型/懸浮液	Insulin aspart 30% +protamine-crystallised insulin aspart 70%	FlexPen NovoMix 30 諾和密斯 30 諾易筆注射液	300 IU/3 ml/	10-20 分鐘	1-4 小時	24 小時	2-8°C	30°C 以下 四星期
速-中效筆型/懸浮液	50% insulin lispro+75% insulin lispro protamin	Humalog Mix 50 Kwikpen 優泌樂筆-混合型 50	100 IU/ml,300 IU/支	15 分鐘	1~3 小時	22-24 小時	2-8°C	30°C 以下 四星期
速-中效/懸浮液	30% RI +70% Human insulin isophane suspension	Humulin 70/30 優泌林- 混合型	10 ml/vial	30-60 分鐘	2-8 小時	24 小時	2-8°C	30°C 以下 四星期
藥劑科學術組製表 (分機 2079)								
更新: 110.11.09								