

陰道栓劑正確使用須知

📖 使用方法：

1. 使用前，洗淨雙手。
2. 將藥物栓劑外包裝去除。
3. 可將栓劑迅速以溫水通過濕潤以利塞入陰道內。
4. 若使用給藥器，可將栓劑放入給藥器前端。
5. 採蹲姿或內診時的姿勢(人躺下，小腿弓起，膝蓋朝上)，輕輕用手(以食指及中指夾住藥片)或給藥器前端伸入陰道，約 1-2 指節深。
6. 在給藥完全後，保持給藥器壓緊的狀況，將給藥器抽出。

📖 注意事項：

1. 孕婦不可使用陰道給藥器，以避免刺激陰道，造成子宮收縮而致流產。
2. 月經期間仍要繼續用藥，不可擅自中斷用藥。
3. 晚上睡覺前使用，可使藥品停留

在陰道之時間延長，而提高療效。

4. 使用後如有黏稠或水液狀之液體自陰道流出，屬正常現象，可在內褲底部墊衛生墊，勿立即進行陰道之沖洗。
5. 使用前後均須用肥皂和清水將手徹底洗淨。
6. 栓劑於室溫下呈凝固狀態以方便投予，於體溫下才會融化，並呈現藥效。故保存之溫度高於體溫時，極易產生軟化、變形等現象。栓劑如軟化或融化時，以原包裝浸於冷水中(20°C 以下)或放回冰箱冷藏即可凝固。

📖 保存方法

除非有特別指示，請於室溫陰涼乾燥處避光儲存。若使用說明書有特別註明要冷藏則要依說明來儲存。

高雄市立聯合醫院藥劑科祝您身體健康！
藥局 TEL(07):5552565 轉 2082、2124