

VIÊM KHÍ QUẢN

細支氣管炎(越南文)

Lời nói đầu :

Viêm khí quản bệnh thường gặp ở đường hô hấp của trẻ sơ sinh, do khí quản tắc nghẽn tạo thành viêm khí quản, thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi và nhất là trẻ khoảng trong ó tháng tuổi, dễ bộc phát vào mùa đông và đầu xuân.

Nguyên nhân sinh bệnh :

Nguyên nhân thường gặp là do vi rút hoà hợp vào đường hô hấp tạo thành, vì rút tuyến vào bệnh dịch cúm cũng có thể dẫn đến loại bệnh này. Bệnh dịch này sẽ lưu hành phổ biến khắp nơi, dễ truyền nhiễm bằng cách thông qua tay và mũi hoặc tay và mắt.

Triệu chứng lâm sán :

Ban đầu có triệu chứng bị nhiễm đường hô hấp trên. ví dụ như : Hắt hơi. Chảy nước mũi, đôi lúc nóng sốt không muốn ăn và cứ kéo dài vài ngày. sau đó sẽ ho và khó thở, nôn nóng bất an.

Tri liệu :

Điều trị theo cách vỗ đờm (lòng ngực vật li trị liệu) và tư thế đỗn lưu (đỗn đờm trong cơ thể ra ngoài). có thể làm giảm sự tắc nghẽn trong khí quản, tiêm nước biển để bổ sung sự cân bằng của chất lỏng trong cơ thể và chất điện giải.

Nhưng điều cần chú ý :

1. Phải rửa tay thường xuyên và tránh tiếp xúc vào niêm mạc mũi hoặc kết mạc mắt.
2. Bệnh nhân cần phải bổ sung đủ lượng nước và nên nghỉ ngơi nhiều.
3. Người mắc bệnh khí quản đa số có thể nghỉ ngơi tại nhà, nếu bệnh nhân nào cùng một lúc mắc nhiều bệnh khác thì đề nghị nhập viện để điều trị.
4. Loại bệnh này sẽ kéo dài liền từ 3 đến 10 ngày, sau đó sẽ khóc ngay, nếu cứ lập đi lập lại nhiều lần bệnh này thì nên suy nghĩ xem thể chất có phải mang tính dị ứng (tính nhạy cảm) không.
5. Ví trẻ không được bú sữa mẹ rất dễ mắc bệnh này. do đó các bác sĩ thường khuyến khích nén cho trẻ bú sữa mẹ.