

## 副甲狀腺造影 Parathyroid scan

### 一、 檢查注意事項

1. 檢查當天請攜帶健保卡，依報到時間至醫療大樓地下二樓(B2)核子醫學科櫃台報到。**此檢查一共分兩個階段，從開始到整個結束大約 3 小時**，兩階段中間的空檔可以離開本科。
2. 此項檢查不需特別空腹，除非同時有其他檢查要求，例如抽血。
3. 打針後照相前如廁請小心，若尿液沾到身體或衣褲，需清洗乾淨及更換衣褲，以免影響影像判讀。

### 二、 其他注意事項

1. 為避免資源浪費，如需改期或取消，請至少提早一個工作天通知本科。若對檢查內容有疑慮需要說明，也可以打電話來詢問。核醫科電話：08-7557885 分機 85400。
2. 檢查藥物含有少量放射性，有懷孕及哺乳可能之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及胎兒之安全。
3. 報到時間非檢查時間，請您屆時耐心等待，我們將盡快為您服務。
4. 怕冷的人可以帶件外套。

### 三、 檢查方式與流程

1. 副甲狀腺造影(Parathyroid scan)主要偵測副甲狀腺是否為引起血鈣異常升高及其他相關疾病的原因，例如：原發性副甲狀腺亢進、副甲狀腺腺瘤。
2. 第一階段：靜脈注射放射性藥物後 10 分鐘，照相時間大約 30 分鐘。
3. 第二階段：靜脈注射放射性藥物後 2 小時，照相時間大約 60 分鐘。
4. 第一階段照相完後的空檔可以離開本科。
5. 照相部位包含頸部與縱膈腔，若**接受過副甲狀腺移植手術**者，需加照移植部位。
6. 上半身衣服有金屬物的受檢者需要更衣(包含內衣、金屬鈕扣、項鍊)。
7. 照相過程中必須保持平躺不動，以求影像清晰。

### 四、 可能的副作用、併發症及處理方式

1. 對特殊體質者暫時可能出現紅疹、畏寒、噁心、嘔吐、氣喘及暈眩等症狀，

其發生率小於十萬分之六。

---

2023.04.20 製定

26055001

NMXXWBB1