

易剋冒膠囊 (Eraflu 75mg) 口服懸浮液配製方法說明

(一) 配製步驟

領藥時，您會拿到 Eraflu (Oseltamivir)膠囊、空瓶(有加水刻度線標記)、小藥杯、藥包紙。

1. 藥包紙光滑面朝內，對折後打開。將所拿到的**Eraflu膠囊全部從鋁箔片中取出**。
2. 把**全部膠囊打開**，內容物全倒在藥包紙光滑面上，再倒入空瓶(有加水刻度線標記)中，並丟棄膠囊外殼。
3. 加入**冷開水**至瓶身所標記的刻度處，蓋上蓋子，**充分振搖**均勻後，Eraflu懸浮液即配製完成，配製後懸浮液濃度為: Oseltamivir 15毫克/西西(即每顆膠囊配成5西西的懸浮液)。
4. 服藥時，請用藥袋內附的**小藥杯**或空針筒量取所需藥量，每次服用量依藥袋指示。

(二) 注意事項

1. 於第一次服用前立即配製，配製後的懸浮液應儲存於**冷藏**環境(可於2-8°C保存17日)。
2. 配製後的懸浮液容易沉澱，**服用前須充分振搖**，並立即以空針筒或小藥杯量取所需用量服用。
3. 如需掩飾懸浮液苦味，可於每次服藥前，量取當次藥量，加入糖水或巧克力糖漿，並立刻服下。


(三) 忘記服藥

請於**記起時立即服用**；若距離下次服藥時間小於兩小時，則不須補服，請跳過此次忘記服用的藥量，於原預定服藥時間服用當次支用量，切勿服用兩倍劑量。

參考資料:

1. 抗病毒藥品Oseltamivir 配製口服懸浮液方法說明, 高雄榮民總醫院 藥學部, 2019/01製
2. Oseltamivir: Drug information, In: UpToDate (Assessed on 12/05/2022)
3. Eraflu (oseltamivir), Prescribing information, Chinese Labeling, December 2019.

易剋冒膠囊 (Eraflu 75mg) 口服懸浮液配製方法圖文說明



因每次服用之藥量不足一顆，需要配製成懸浮液使用。
領藥時，您會拿到配製組合包，內含：(1) 配製說明單、(2) Eraflu(易剋冒)膠囊、(3) 藥包紙、(4) 空瓶(有加水刻度線標記)、(5) 小藥杯(有使用量刻度線標記)。
於第一次服用前立即配製，配製方法如下所示。



*配製完成後的懸浮液 **請冷藏** 保存。

Eraflu(Oseltamivir) 病人自行配製口服懸浮液 藥師交付流程

版本資訊: 高雄榮民總醫院 藥學部(2019/01 製)、屏東榮民總醫院 藥劑科(2023/02 修訂與重製)

(一)交付流程

1. 取事先印好之標籤紙，貼上相對應處方內容之標籤(標示有「容量 ml」指示配製後總體積)。
 2. 依照配製體積需求取 60 或 30 ml 的含蓋空瓶，標示加水刻度線(配製後總體積)。
 3. 將 (1)Oseltamivir cap、(2)用藥指導單張、(3)藥包紙、(4)含蓋空瓶(標示配製後總體積刻度線)、(5)小藥杯(標示服藥量刻度線) 放入藥袋中。
 4. 交付藥品並進行用藥指導。
- ※ 若病人或家屬無法執行上述步驟完成配製時，藥師應主動協助完成(將 Oseltamivir 膠囊內容物倒在藥包紙，並倒入含蓋空瓶中，再加冷開水至刻度線，蓋上蓋子後搖勻)，再交付病人攜回依每次使用量服用。
- ※ 因洗腎病人處方為 0.4 cap TIW，請藥師提供以下衛教內容：整個療程只需服用 3 個劑量(一週 3 次，在洗腎後服用)，配製總體積雖為 10 ml，但療程只需 6ml，多餘的部分如果嘔吐可做為補服使用，療程結束後，剩餘的藥量請丟棄。
- ※ 每次服用 1.5ml 的兒童，因醫院提供的量杯無法量取，請家長自行購買給藥針筒。

(二)用藥指導資訊

1. 於第一次服用前立即配製，配製後的懸浮液應儲存於冷藏環境(可於 2-8°C 保存 17 天)。
2. 配製後的懸浮液容易沉澱，服用前須充分振搖，並立即以空針筒或小藥杯量取所需用量服用。
3. 如需掩飾懸浮液苦味，可於每次服藥前，量取當次藥量，加入糖水或巧克力糖漿，並立刻服下。
4. 若忘記服藥請於記起時立即服用；若距離下次服藥時間小於兩小時，則不須補服，請跳過此次忘記服用的藥量，於原預定服藥時間服用當次支用量，切勿服用兩倍劑量。

(三)常見劑量調整之配製對照簡表

兒科/洗腎劑量	每次 Oseltamivir 劑量			總發藥量 (治療劑量共 10 個 dose)	配製後總體積 (配製濃度: 15 mg/ mL)
	mg	膠囊數	mL		
兒童 ≤15 kg	25	0.3	1.5	3 Cap	15 mL
	30	0.4	2	4 Cap	20 mL
兒童 >15~23 kg	45	0.6	3	6 Cap	30 mL
兒童 >23~40 kg	60	0.8	4	8 Cap	40 mL
兒童 >40 kg	75	1	不須配製	10 Cap	不須配製
洗腎 (0.4 Cap TIW)	30	0.4	2	4 Cap	10 mL (只需 6 mL)

※ 在固定濃度 15 mg/ mL 下，若開立特殊劑量(服藥體積非整數)，且藥師判斷其泡水配製後無法準確測量者，以磨粉處理。

參考資料:

1. 抗病毒藥品 Oseltamivir 配製口服懸浮液方法說明, 高雄榮民總醫院 藥學部, 2019/01 製
2. Oseltamivir: Drug information, In: UpToDate (Assessed on 12/05/2022)
3. Eraflu (oseltamivir), Prescribing information, Chinese Labeling, December 2019.