

# 克流感膠囊 (Tamiflu 75mg) 口服懸浮液配製方法說明

## (一) 配製步驟

領藥時，您會拿到 Tamiflu (Oseltamivir)膠囊、空瓶(有加水刻度線標記)、小藥杯、藥包紙。

1. 藥包紙光滑面朝內，對折後打開。將所拿到的**Tamiflu膠囊全部從鋁箔片中取出**。
2. 把**全部膠囊打開**，內容物全倒在藥包紙光滑面上，再倒入空瓶(有加水刻度線標記)中，並丟棄膠囊外殼。
3. 加入**冷開水**至瓶身所標記的刻度處，蓋上蓋子，**充分振搖**均勻後，Tamiflu懸浮液即配製完成，配製後懸浮液濃度為: Oseltamivir 15毫克/西西(即每顆膠囊配成5西西的懸浮液)。
4. 服藥時，請用藥袋內附的**小藥杯**或空針筒量取所需藥量，每次服用量依藥袋指示。

## (二) 注意事項

1. 於第一次服用前立即配製，配製後的懸浮液應儲存於**冷藏**環境(可於2-8°C保存17日)。
2. 配製後的懸浮液容易沉澱，**服用前須充分振搖**，並立即以空針筒或小藥杯量取所需用量服用。
3. 如需掩飾懸浮液苦味，可於每次服藥前，量取當次藥量，加入糖水或巧克力糖漿，並立刻服下。


## (三) 忘記服藥

請於**記起時立即服用**；若距離下次服藥時間小於兩小時，則不須補服，請跳過此次忘記服用的藥量，於原預定服藥時間服用當次支用量，切勿服用兩倍劑量。

參考資料:

1. 抗病毒藥品Oseltamivir 配製口服懸浮液方法說明, 高雄榮民總醫院 藥學部, 2019/01製
2. Oseltamivir: Drug information, In: UpToDate (Assessed on 12/05/2022)
3. Tamiflu (oseltamivir), Prescribing information, Chinese Labeling, manuf. Cenexi SAS, France; October 2010.

# 克流感膠囊 (Tamiflu 75mg) 口服懸浮液配製方法圖文說明



因每次服用之藥量不足一顆，需要配製成懸浮液使用。  
領藥時，您會拿到配製組合包，內含：(1) 配製說明單、(2) Tamiflu(克流感)膠囊、(3) 藥包紙、(4) 空瓶(有加水刻度線標記)、(5) 小藥杯(有使用量刻度線標記)。  
於第一次服用前立即配製，配製方法如下所示。



\*配製完成後的懸浮液 **請冷藏** 保存。