



高榮藥物不良反應小組通告

日期: 99/07/02

主旨	宣導疑似使用 cisplatin 引起之不良反應及摘錄 5 月份食品藥物管理局公告之藥物安全警訊
說明	<p>1. 日前接獲本院醫師通報，懷疑病患因施打 cisplatin 發生 anaphylactic shock。查此病患自 96/10 起多次施打 A 廠牌之 cisplatin，之後因藥廠停產，本院於 98 年更換為 B 廠牌之 cisplatin，病患於 99/1 第二次施打此廠牌之 cisplatin 後，產生 anaphylactic shock。藥師評估可能與替換 B 廠牌有關，因目前本院仍使用 B 廠牌，請臨床醫師使用時多加注意。(案例請參閱藥劑部網頁 http://www.vghks.gov.tw/ph/ADR.htm - 通報案件)</p> <p>2. 食品藥物管理局藥物安全警訊</p> <p>(1) 孕婦於懷孕後期使用 SSRIs，可能增加胎兒產生罕見持續性肺高血壓 (persistent pulmonary hypertension, PPHN) 之風險。</p> <p>(2) 使用 PDE5 抑制劑藥品(如 sildenafil)應小心視覺異常、耳部疼痛、耳鳴、耳聾等不良反應。</p> <p>(3) 含 Tramadol 成分藥品可能產生自殺傾向之風險，應謹慎用於同時使用抗憂鬱藥品或抗精神病藥品、酗酒，以及情緒障礙或憂鬱之患者。</p>