



高榮藥物不良反應小組通告

日期: 99/10/19

主旨	摘錄食品藥物管理局公告之藥物安全警訊及宣導疑似合併使用 lamotrigine 與 valproic acid 引起之不良反應
說明	<p>1. 食品藥物管理局新聞稿說明媒體報導「臺灣首例疑似使用 Avandia 藥品致死案例」</p> <p>http://adr.doh.gov.tw/manage/Data/B01/635.pdf：</p> <p>“67 歲男性，有高血壓、糖尿病病史，使用 Avandia 治療糖尿病 2 年多，血糖控制也良好，後來忽然猝死。根據通報資料，無法認定這個猝死個案之死亡原因跟 Avandia 之使用有因果關係，在該個案之眾多可能導致死亡因素當中，用藥因素亦無法排除。整體而言，不良反應通報資料係作為藥品安全疑慮訊號之偵測，以提供藥品安全管理政策之參考。”</p> <p>2. 日前接獲本院醫師通報，懷疑病患合併使用 lamotrigine 與 valproic acid 治療癲癇，發生 Steven-Johnson syndrome。根據研究顯示，服用 lamotrigine 產生致命性皮炎不良反應(如 Steven-Johnson syndrome)之發生率為 0.3%(成人) ~ 0.8%(兒童)，併用 valproic acid 治療癲癇病患時，此不良反應發生率顯著上升；因此併用時，臨床醫師需注意調整 lamotrigine 之起始劑量，建議成人及 12 歲以上小孩由 25mg qod 開始使用，以避免發生嚴重皮疹之不良反應。</p>

