



## 高榮藥物不良反應小組通告

日期: 100/4/21

主旨	轉知藥物不良反應小組會議結果及摘錄食品藥物管理局關於 orlistat 及孕婦使用抗精神病藥品之相關安全資訊。
說明	<ol style="list-style-type: none"><li>02/22/2011：美國 FDA 警示懷孕第三期婦女服用 antipsychotic 藥物，其新生兒可能會有錐體外徑症狀（EPS）和藥物戒斷症候群出現。食品藥物管理局呼籲醫師，為懷孕患者處方抗精神病藥品時，宜審慎評估其臨床效益及風險，並小心監控新生兒可能發生錐體外徑症狀或戒斷症狀，如激動、肌張力不正常增加或減少、顫抖、嚴重呼吸困難、餵食困難..等，以及時給予適當處置。同時提醒正在服用抗精神病藥品之孕婦患者，不可擅自停藥，如有任何疑問或不適，應儘速回診處方醫師；同時應忠實告知產檢醫師，目前使用藥物情形。</li><li>04/15/2011：近期加拿大之研究報告指出，透過回溯性觀察加拿大 953 位初次使用 orlistat 成分藥品病人之就醫紀錄，發現病人於使用該藥品後因腎功能問題住院之比率些微提升。惟，該研究僅是觀察性研究，無法確認該藥品與腎功能異常之關聯性，仍需進一步研究。食品藥物管理局籲請醫師謹慎評估其臨床效益及風險，並監視病人用藥後不良反應發生情形。</li><li>100 年 1-3 月份醫師通報藥物不良反應件數銳減，籲請臨床醫師加強通報藥物不良反應。</li></ol> <p>相關訊息請參閱 行政院衛生署食品藥物管理局網頁 <a href="http://adr.doh.gov.tw/default.asp">http://adr.doh.gov.tw/default.asp</a></p>