



## 高榮藥物不良反應小組通告

日期: 105/8/4

主旨	轉載台灣食品藥物管理局(TFDA)公告使用 Fusidate 成分藥品之用藥安全資訊
說明	<p>1.105/8/3: 因全國藥物不良反應通報中心近年接獲數例疑似使用含sodium fusidate成分藥品後而發生肝膽疾病相關或橫紋肌溶解症 (rhabdomyolysis) 之不良反應通報案例，TFDA經查，含sodium fusidate成分藥品之中文仿單已刊載相關風險，仿單刊載情形如下：(1)「注意事項」處已刊載：「對於肝功能不全、膽道不正常或同時使用其他經由膽汁排泄的抗生素如lincomycin及rifampicin之病人，當投予高劑量長期治療，應定期做肝功能檢查」。(2)「副作用」處已刊載：可逆性的氨酸轉氨酵素增加、可逆性黃疸、膽汁鬱滯、橫紋肌溶解...等相關不良反應。(3)「禁忌症」處已刊載：「禁忌與statin類藥物合併用藥」。(4)「藥品交互作用」處已刊載：調整口服抗凝血劑的劑量是必要的。以CYP-3A4生物轉化藥物治療之病人應避免使用Sodium fusidate。因此，為保障病人用藥安全，含sodium fusidate成分藥品具引起肝膽疾病相關不良反應及藥品交互作用之潛在風險，針對肝功能不全或急性肝衰竭高危險群者，應更謹慎選擇用藥、治療時程及使用劑量，並提醒病人定期回診做肝功能檢查</p> <p><a href="http://www.fda.gov.tw/tc/includes/SiteListGetFile.ashx?mid=133&amp;id=21652&amp;chk=7c359573-7935-48d2-a40c-a23c73afe34">http://www.fda.gov.tw/tc/includes/SiteListGetFile.ashx?mid=133&amp;id=21652&amp;chk=7c359573-7935-48d2-a40c-a23c73afe34</a></p>