

# Felodipine

編號：8

學名	商品名	中文商品名
Felodipine	Feloen E.R.F.C. Tab. (Felodipine 5mg + Enalapril 5mg)	菲洛安持續性藥效膜衣錠 公絲
	Plendil Tab. 5mg	普心寧持續性藥效錠 5 公

## 【作用】

本品是具有高度血管選擇性的鈣離子拮抗劑，藉由降低全身血管張力而降低血壓。由於可改善心肌對氧的供給與需求之平衡，故另外有抗心絞痛及抗缺血的作用。

## 【用法】

本藥須由醫師處方使用，錠劑應配以開水整顆吞服，不可剝半或磨碎服用，可於空腹或飯後服用。

## 【注意事項】

1. Felodipine 在少數的病例中會引起明顯的低血壓。
2. 與其他藥品併用時請先告知醫師、藥師。
3. 葡萄柚汁會增加 felodipine 的血中濃度，服用本藥期間避免併服葡萄柚汁
4. 非經醫師指示，請勿擅自停藥或增加劑量。
5. 請按時量血壓及定時回診。
6. 應將藥物放置於室溫下，避免太陽直射且小孩無法拿到的地方。
7. 請勿讓他人服用您的藥品。

## 【副作用】

與其他動脈血管擴張劑相同，可能會出下列症狀：潮紅、頭痛、心悸、暈眩、疲倦。

## 【忘記服藥時該怎麼辦】

如果忘記服藥，應該在記起時，立即服用。如果距離下次服藥時間太近，則只要服用一次劑量，不可同時服用兩次劑量。

## 【懷孕或哺乳時該怎麼辦】

孕婦、計劃懷孕或授乳的婦女，請於開始服藥前告知醫師。若於服藥期間懷孕，請務必告知您的醫師，醫師將加以評估，決定續用與否。

此教育單張並未包含本藥所有的資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。諮詢電話 06-3125101 轉 1203  
高雄榮民總醫院臺南分院藥劑科製