

學名	商品名	中文商品名
Regular Insulin 常規型胰島素 每瓶10西西；每西西100單位	Actrapid HM	愛速基因人體胰島素
Insulin Monocomponent ,Human Isophane 中效型胰導素 每瓶10西西；每西西100單位	INSULatard	因速來達胰島素注射液
Insulin Aspart 30%, Insulin Aspart protamine 70% 混合型胰島素 每瓶3西；每西西100單位	Novomix 30 Penfill	諾和密斯30諾芯管

【作用】

用於補充體內胰島素分泌的不足，以控制糖尿病。

【用法】

請遵照醫師處方用量，一般為皮下注射。注射部位可選擇上臂兩側、腹部、臀部、大腿等區域，每次注射輪換不同的注射點，注射部位應每次相距約3公分。

【注意事項】

1. 常規型胰島素應為澄清，如變混濁則應丟棄，其它型胰島素則為混濁液，使用前須於手上轉至均勻且不冰，再行抽藥注射。
2. 如病患感不適，尤以嘔吐、發燒、腹瀉時，即使無法進食，也應注射，但因可能需調整用量，故應與醫師聯絡。
3. 告知醫師所有使用之藥品，使用含酒精或糖份之成藥前，應先告知醫師或藥師。
4. 注射完 30 分鐘內不可抽煙，因抽煙會降低皮下吸收

量。

5. 飲食及運動應規律，定量定時。延遲飲食或過度運動會引起低血糖。

【副作用】

若有以下低血糖症狀：不尋常的飢餓感、無力感、顫抖、心跳加快、冒冷汗、視力模糊、精神意志不易集中，應立刻補充含糖飲料或食物，如果汁、糖水或糖果，如未見改善則應送醫治療。

低血糖嚴重昏迷時，立即送急診。

【藥品該如何保存】

一般置於冰箱下層冷藏，不可冷凍。開瓶後置陰涼處可使用一個月，沒用完應丟棄。旅行則放置隨身行李，避光、避熱及防震。

此教育單張並未包含本藥所有的資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。諮詢電話 06-3125101 轉 1203

高雄榮民總醫院臺南分院藥劑科製