

克流感膠囊(Tamiflu) 配製口服懸浮液方法說明

(一) 配製步驟

領藥時，您會拿到克流感膠囊、空瓶(畫有加水刻度線)、小藥杯、藥包紙。

1. 將克流感膠囊全部從鋁箔中取出。藥包紙光滑面朝內，對折後打開。
2. 把膠囊打開，內容物全部倒在藥包紙光滑面上，再倒入空瓶(畫有加水刻度線)中，並丟棄膠囊外殼。
3. 加入冷開水至瓶身刻度處，蓋上蓋子，充分振搖均勻後，藥品即配製完成。
4. 服藥時，請用空針筒或藥袋內附的小藥杯量測所需藥量，每次服用量依藥袋指示。

(二) 注意事項

1. 建議於第一次服用前立即配製。
2. 配製後的懸浮液應冷藏 (2-8°C)，並在14天內使用完畢。
3. 配製後的懸浮液較容易沉澱，服用前須充分振搖，並立即以空針筒或小藥杯量取所需用量服用。
4. 如果小朋友不願意服藥，可於每次服藥前，量取當次藥量，加入果糖或巧克力糖漿，並立刻服下。
5. 如忘記服藥，且想起來時，還沒有超過服藥時間很久，請於記起時馬上服用；但若已接近下次服藥時間，請於原預定服藥時間服用，不需服用兩倍劑量。
6. 配製後懸浮液含Oseltamivir phosphate 15毫克/西西(即每顆膠囊配成5西西)，每次服用量請見藥袋。