



高榮藥物不良反應小組通告

日期: 99/12/16

主旨	<ol style="list-style-type: none">1. 轉載 sulfamethoxazole/trimethoprim 成分藥品，全國藥物不良反應中心公告之用藥安全相關警訊2. 宣導全國藥物不良反應中心針對 erlotinib 及 thiazolidinediones 國內通報不良反應分析
說明	<ol style="list-style-type: none">1. 2010 年 5 月至 2010 年 10 月財團法人藥害救濟基金會全國藥物不良反應通報中心接獲多起 sulfamethoxazole/trimethoprim 注射劑引起精神障礙相關通報案件 (delirium、hallucination 等症狀)，敬請各醫療單位留意院內是否有類似的不良反應發生，若有疑似案例發生，請立即進行院內藥物不良反應通報。2. 全國藥物不良反應通報資料庫 (2005-2010 年 7 月 13 日) 中， Erlotinib(Tarceva)[®] 相關之不良反應通報案件共 424 件。皮膚系統之不良反應佔最多(37.0%)，其中多為皮膚紅疹，另外為瘡瘡樣疹、甲溝炎、史蒂文生氏-強生症候群、毒性表皮溶解症。胃腸道系統之不良反應次之(11.1%)，其中多為腹瀉，另外為胃腸潰瘍與出血。而其他的不良反應包括呼吸道系統(7.8%)、心臟血管系統(2.1%)、肝臟毒性(2.1%)。統計至 2010 年 7 月 31 日止，疑似因 Rosiglitazone 引起之不良反應案件共 44 例，國內通報案件的不良反應症狀以發生肝膽功能異常為多，可能與國人特別關注此藥品引起之肝功能異常有關。而歸屬於心臟功能異常的不良反應佔 11.3%。疑似因 Pioglitazone 引起之不良反應案件共 38 例，通報的案件歸屬於心臟功能異常的不良反應佔 10.9%。(詳細內容請參閱藥物安全簡訊 Vol_31，網頁 http://www.tdrf.org.tw/ch/03_message/mes_03_list.asp)。