

科別	藥劑部	編號：6100007
主題	陰道栓劑的正確使用方法	101.11.14 訂定
製作單位	藥劑部	一修
		101.11.16 審閱

### 「一般說明」

1. 以肥皂及清水充分清潔雙手。
2. 將陰道栓劑外包裝去除。
3. 仰臥並彎曲雙腿，兩腳微張。
4. 輕輕的用手將栓劑推入陰道深部(至少 1 指手指節深)，藥物不會掉出即可以。
5. 每次使用完後，也須徹底洗淨雙手。

### 「注意事項」

1. 用藥期間，避免性交或使用保險套，以免再次感染。
2. 非醫師指示，懷孕或哺乳婦女請不要使用。
3. 一般在睡前或醫師指示時間使用。
4. 陰道栓劑應防潮，保存在小孩不易拿到及陰涼處。
5. 若天氣較熱或存放於較熱處，以致栓劑變軟無法塞入時，可將放置冰箱冷藏約 30 分鐘，或除去外包裝前置於冷水使其變硬。

### 「何時找醫師」

若使用後病情惡化或癢、刺激感時，應儘快讓醫師知道。

備註：每年修訂或審閱乙次。

警語：所有衛教資訊內容僅供參考使用，無法取代醫師診斷與相關建議，若有身體不適，請您儘速就醫，以免延誤病情。