

香江驚傳首宗化藥打錯途徑疏失

6/23 香港沙田威爾斯親王醫院發生首宗嚴重而罕見的醫療疏失，一名女醫生被指錯誤地把靜脈注射的化療藥物注射到一名 21 歲患有急性淋巴白血病(血癌)的女患者脊髓，出現發燒、頭部僵硬及昏迷頸硬等情況，現時病情危殆。院方於 5 日後證實事件並暫停該醫生的臨床職務。

香港醫院藥師學會發言人崔俊明表示，1968 年至 2005 年，全球醫學界最少發生 55 件同類事故。美國曾發生 37 件同類事故，英國及澳洲分別有 14 件及 3 件，84% 受影響病人最終死亡，即便搶救成功，日後亦可能四肢癱瘓，成為植物人。

崔俊明認為發生此類事故的主因是醫護人員同一時間為病人注射兩種藥物，引發出錯的機會；將兩種藥物一同抽存於針筒及運送，亦增加出錯風險。建議醫管局減少同一時間為病人注射幾種藥物。若及時發現打錯針，醫護人員可立即為病人抽走脊髓液，加入生理鹽水，過程如洗胃一樣，藉由稀釋藥力來減慢毒素擴散。

該院暫採將一般經靜脈注射的藥物先加入輸注液再替病人輸入藥物。醫管局聘請海外專家，在一個月內調查打錯化療針事故及提出

改善建議。

在眾多化療藥之中，只有極少數化療藥可直接打入脊髓；考慮化療藥加入輸注液後的安定性，部分靜脈注射的藥物亦不適合由藥師先調配至大瓶點滴中；患者若同次使用多種化療藥物合併療法，有些還需要注意給藥順序；化療藥輸注時，臨床上較在意藥物外漏的處置，因台灣仍無文獻所建議用的解毒劑，萬一發生僅可以冷敷或熱敷物理性療法減緩症狀。

參考資料：

香港新浪網。

http://news.sina.com.hk/cgi-bin/news/show_news.cgi?ct=headlines&type=headlines&date=2007-06-25&id=2407295

作者：毛志民藥師

完稿日期：2007/6/28

刊登於本文刊登於藥師週刊第 1529 期。2007/7/2 香江驚傳化療藥打

錯疏失<http://factory.mylove.net.tw/drug/1529/0302.htm>