



高榮藥物不良反應小組通告

日期: 2024/3/26

主旨	轉載台灣衛福部食藥署(TFDA)公告 cilostazol 成分安全資訊
摘要 說明	<ol style="list-style-type: none">1. 訊息緣由: 全國藥物不良反應通報中心接獲數例疑似因使用 cilostazol 併用 2 種以上抗血小板或抗凝血劑後發生出血之案件，其中包含死亡案例。2. 食品藥物管理署說明: 經查，我國衛生福利部核准含 cilostazol 成分藥品許可證共 12 張，我國於 103 年決議限縮 cilostazol 之適應症，其中文仿單之「禁忌症」處已刊載「不可投與於接受 2 種或 2 種以上抗血小板或抗凝血劑(如：acetylsalicylic acid, clopidogrel, heparin, warfarin, acenocoumarol, dabigatran, rivaroxaban 或 apixaban 等)治療者」。3. 醫療專業人員應注意:<ul style="list-style-type: none">● 我國核准 cilostazol 之適應症為「用於無休息時疼痛及周邊組織壞死，經生活模式改變及其他治療後，仍無法充分改善之間歇性跛行病人；以及用於無法耐受 aspirin 且屬非心因性栓塞之腦梗塞患者，以預防腦梗塞之再復發」。● Cilostazol 藥品之禁忌症包含「接受 2 種或 2 種以上抗血小板或抗凝血劑(如：acetylsalicylic acid, clopidogrel, heparin, warfarin, acenocoumarol, dabigatran, rivaroxaban 或 apixaban)等治療者」，臨床上應注意病人多重用藥情形。● Cilostazol 具潛在出血風險，應審慎使用於：<ol style="list-style-type: none">(1)同時併服抗凝血藥品、抗血小板凝集藥品或血栓溶解藥品的病人。(2)血小板過低症的病人。(3)因手術或疾病狀態而有出血傾向的病人。4. 病人應注意事項:<ul style="list-style-type: none">● 若您正在服用抗血小板或抗凝血藥品，如 aspirin, clopidogrel, heparin, warfarin, acenocoumarol, dabigatran, rivaroxaban 或 apixaban 等，請主動告知您的處方醫師。● 就醫時，請告知醫師您是否現有出血相關問題或病史，如腦出血、出血性潰瘍等。● 若您於用藥期間出現疑似出血之徵兆或症狀，如咳血、吐血、咖啡渣狀嘔吐物、血尿、血便、黑便、牙齦異常流血、經血異常量多、不明原因產生瘀血或者血流不止等，應立即尋求醫療協助。● 若對於用藥有任何疑問或疑慮，請諮詢醫療人員。

連結 網址	https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638467094935083585&type=2&cid=46371				
本院 品項	ATC碼	藥碼	健保碼	中文藥名 (Chinese Drug Name)	英文藥名一 (English Drug Name 1)
	B01AC23	07344	AC48377100	普益達錠 1 0 0 毫克	Plestar Tab 100mg (Cilostazol)