

Sildenafil

商品名	中文商品名	含量
Revatio	瑞肺得膜衣錠	20毫克

作用：此藥用於治療肺動脈高血壓。

使用本藥之前，有下列狀況應告知醫師：

1. 曾經對此藥有過敏反應者。
2. 打算懷孕、已懷孕或哺乳者。
3. 若您正在服用亞硝酸鹽類藥物。
4. 若您患有出血問題、心臟病、肝臟疾病、潰瘍性疾病或有中風病史。

正確服藥及儲存方法：

1. 該藥可與食物併服或空腹服用。若引起肚子不舒服則與食物一起服用。
2. 忘記服藥，儘快補服；若已接近下次服藥時間，就不必補服，切記不可服用兩倍劑量。
3. 改變劑量或停藥前，請和醫師討論。
4. 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。

注意事項：

1. 就診時請告知您的醫師有關您的所有用藥（處方藥或非處方藥、天然滋補品、維他命劑）及健康問題。
2. 服藥前間避免飲酒（包括葡萄酒、啤酒和白酒）。
3. 避免喝葡萄柚汁或吃葡萄柚。
4. 此藥不可與改善性能力或性慾的其他藥物併用。

可能發生之副作用：

腹瀉或稀便、潮紅、低血壓、頭痛、腹痛或胃灼熱、鼻塞、視力改變偶爾發生。

若您有下列任一症狀，請立即就醫：

1. 懷疑藥物服用過量中毒。

2. 過敏反應的症狀，如喘息、胸悶、發熱、發癢、嚴重咳嗽、皮膚發青、或臉部、嘴唇、舌頭、咽部腫脹。
3. 呼吸困難。
4. 胸痛或胸悶或心動過速。
5. 嚴重眩暈或失去知覺。
6. 視力突然改變或喪失。
7. 聽力改變。

如果您還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，告知您的病歷號、聯絡電話、藥袋上藥品名及日期，以便回覆。祝您早日康復。

高雄榮民總醫院藥學部 謹製

服務電話：3422121-6111、6114 (門診藥局)

3422121-6104 (藥物資訊中心)

201503 修訂