



## 高榮藥物不良反應小組通告

日期: 104/12/29

主旨	轉載台灣食品藥物管理局(TFDA)公告使用 SGLT2 Inhibitors 及 Repaglinide 之藥品用藥安全資訊
說明	1.104/12/22: TFDA發佈關於Repaglinide併用clopidogrel可能產生交互作用，導致低血糖風險之安全訊息。 <a href="http://www.fda.gov.tw/tc/includes/SiteListGetFile.ashx?mid=133&amp;id=17550&amp;chk=c0e57f08-3d44-4577-9003-a7d1a04c52be">http://www.fda.gov.tw/tc/includes/SiteListGetFile.ashx?mid=133&amp;id=17550&amp;chk=c0e57f08-3d44-4577-9003-a7d1a04c52be</a> 2.104/12/28: FDA發佈關於SGLT2 Inhibitors (包括Dapagliflozin、Empagliflozin)可能引起酮酸中毒及嚴重泌尿道感染風險之安全訊息。 <a href="http://www.fda.gov.tw/tc/includes/SiteListGetFile.ashx?mid=133&amp;id=17547&amp;chk=fccb59a1-75a7-47af-aea3-f9ad900ada7f">http://www.fda.gov.tw/tc/includes/SiteListGetFile.ashx?mid=133&amp;id=17547&amp;chk=fccb59a1-75a7-47af-aea3-f9ad900ada7f</a>