



高榮藥物不良反應小組通告

日期: 2021/02/02

| 主旨 | 轉載台灣衛福部食藥署(TFDA)公告 erythromycin 成分藥品安全資訊 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------------|-----|------|------|---------|----------|--------|-----------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 摘要說明 | <ol style="list-style-type: none">1. 訊息緣由: 2020/12/17 英國醫藥管理局(MHRA)發布安全資訊, 含 erythromycin 成分藥品具 QT 間隔延長、併用口服抗凝血劑之交互作用及嬰兒肥厚性幽門狹窄 (infantile hypertrophic pyloric stenosis)之風險。2. 食品藥物管理署說明: 經查, 我國 erythromycin 中文仿單未刊載 QT 間隔延長、致命性心律異常及嬰兒肥厚性幽門狹窄(infantile hypertrophic pyloric stenosis)等相關警訊。3. 醫療專業人員應注意:<ul style="list-style-type: none">● 處方含 erythromycin 成分藥品予下列病人時, 應考量其臨床效益與風險:<ul style="list-style-type: none">✓ 具心臟疾病或心臟衰竭之病人✓ 心臟傳導障礙或具臨床意義之心律徐緩情況之病人✓ 併用其他與 QT 間隔延長相關藥品之病人● 含 erythromycin 成分藥品與含 rivaroxaban 成分藥品併用時, 可能會產生交互作用, 如需併用直接作用型抗凝血劑藥品(包含 rivaroxaban、edoxaban、dabigatran 及 apixaban), 於處方前應考量其臨床效益及風險。● 處方含 erythromycin 成分藥品予嬰兒時, 應審慎評估其臨床效益及風險。4. 病人應注意事項:<ul style="list-style-type: none">● 就醫時, 請主動告知自身疾病史(包含心臟相關疾病)及用藥史, 醫師將進一步評估您的用藥。● 若您於使用含 erythromycin 成分藥品期間出現心臟不適或出血之症狀及癥兆, 請盡速尋求醫療協助。● 若家中嬰兒於使用含 erythromycin 成分藥品期間出現嘔吐或於餵食時出現躁動情況, 請盡速尋求醫療協助。● 若您對用藥有任何的疑問或疑慮, 請諮詢醫療專業人員。切勿於諮詢醫療專業人員前自行停藥。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結網址 | https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637477719467617840 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本院品項 | | <table border="1"><thead><tr><th>ATC 碼</th><th>商品名</th><th>中文藥名</th><th>含量規格</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">J01FA01</td><td>Erymycin</td><td>毅力黴素膠囊</td><td>250mg/cap</td></tr><tr><td>Erythrocin</td><td>威黴素靜脈注射劑</td><td>500mg/vial</td></tr></tbody></table> | ATC 碼 | 商品名 | 中文藥名 | 含量規格 | J01FA01 | Erymycin | 毅力黴素膠囊 | 250mg/cap | Erythrocin | 威黴素靜脈注射劑 | 500mg/vial | | | |
| ATC 碼 | 商品名 | 中文藥名 | 含量規格 | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA01 | Erymycin | 毅力黴素膠囊 | 250mg/cap | | | | | | | | | | | | | |
| | Erythrocin | 威黴素靜脈注射劑 | 500mg/vial | | | | | | | | | | | | | |