


| | | |
|------|-------------|--------------|
| 科別 | 藥劑部 | 編號：6100005 |
| 主題 | 鼻用噴劑的正確使用方法 | 101.11.14 訂定 |
| 製作單位 | 藥劑部 | 一修 |
| | | 101.11.16 審閱 |

「一般說明」

1. 用肥皂及清水充分清潔雙手。
2. 使用鼻製劑前先輕擤鼻涕，並將鼻孔清洗乾淨。
3. 依照藥物之特性(若為懸浮劑型)，給予上下均勻混合後開始使用。
4. 移開瓶蓋與夾子。
5. 第一次使用時，需對空壓數次直到產生微細噴霧狀為止。
6. 頭輕微向前傾，並將噴嘴置入一邊鼻孔內，方向稍為向外，離開鼻中隔，並將手指壓住另一邊鼻孔。
7. 用鼻吸氣時，同時請按壓按鈕一口氣到底。
8. 移出噴嘴，並用口呼氣。
9. 同時，另一邊鼻孔也需重覆步驟 6-8。



「注意事項」

1. 使用完畢後，請用乾淨的乾紙巾來擦拭噴嘴及蓋子內面。請勿直接使用別針或任何利器在噴嘴上。
2. 清潔完後請立即蓋回蓋子，以防塵保持平內壓力。

3. 每各鼻孔之使用劑量，請依照醫師指示使用。
4. 不可使用變色或有異味的製劑。
5. 避光，置於陰涼處。
6. 不要與別人共用藥液，以防感染擴散。

「何時找醫師」

若病情更糟，鼻腔太乾或有燒灼感或慢性水腫、嚴重鼻塞甚至流鼻血，應儘快讓醫師知道。

備註：每年修訂或審閱乙次。

警語：所有衛教資訊內容僅供參考使用，無法取代醫師診斷與相關建議，若有身體不適，請您儘速就醫，以免延誤病情。