

藥 訊

發行人: 曾碧榮

總編輯: 曾淑鈺

編輯: 葉明欽

發行日期: 96年 8月



本期內容

1 藥物安全藥品異動訊息

1.1 避免併用Ceftriaxone sodium靜脈注射劑與含鈣溶液

1.2 安眠藥有危險夢遊之虞 藥廠將加註警語

2 藥品相關之廠商來文公佈欄

2.1 台大系列輸注液與其他藥物間混合之安定性：

3 藥物相關專題介紹

3.1 Cetuximab 100mg/50ml/vial

4 醫藥文獻新知摘要選粹

4.1 比較兩種治療痛風的藥物 febuxostat 和 allopurinol 在患有高尿酸血症及痛風發作的病人身上其安全性和效果。

4.2 Propylthiouracil 與 methimazole用於治療懷孕婦女甲狀腺亢進的比較。

4.3 Terbinafine 在B肝病人導致的急性自體免疫性肝炎。

5 第三十三次藥事委員會決議

1. 藥物安全藥品異動訊息

1.1 避免併用Ceftriaxone sodium靜脈注射劑與含鈣溶液

抗生素之ceftriaxone sodium因為與鈣不具相容性，若與鈣或含鈣溶液或含鈣產品併用，會產生calcium-ceftriaxone沈澱，特別容易沈澱在肺臟及腎臟引起嚴重不良反應，尤其是高膽紅素血症之新生兒（hyperbilirubinemia neonates）或早產兒不可給予該抗生素。Ceftriaxone sodium注射劑不僅不可與含鈣之溶液混合或併用之外，即使是使用不同輸注管也不行，若治療上之需要，也必須在注射ceftriaxone sodium 48小時之後才能再給予病患含鈣之溶液或其產品。

衛生署於96.07.06發佈新聞呼籲醫師為病患處方含ceftriaxone sodium成分藥品時宜謹慎小心避免與含鈣溶液併用，倘若治療上需要，也必須在使用ceftriaxone sodium之後48小時才可再給予含鈣溶液。

本部因應措施：於該藥品基本檔案加註警語，提醒醫療人員使用該藥時應注意可能產生之副作用。

1.2 安眠藥有危險夢遊之虞 藥廠將加註警語

初次使用下列藥品可能會發生夢遊中開車、睡夢中進食等不良反應，衛生署決定要求含下列成份的安眠藥必須在說明書上加註相關警「服用本品可能出現夢遊行為，例如開車、打電話及準備與食用食物」，Brotizolam、Diazepam、Estazolam、Fludiazepam、Flunitrazepam、Flurazepam、Lorazepam、Medazepam、Midazolam、Nimetazepam、Nitrazepam、Triazolam、Zaleplon、Zolpidem、Zopiclone；

本部因應措施：於該藥品說明基本檔案加註警語，提醒病患使用該藥時應注意可能產生之副作用。

2.藥品相關之廠商來文公佈欄

2.1 台大系列輸注液與其他藥物間混合之安定性：

自本院開始使用台大系列輸注液後，本部即經常接獲護理人員來電詢問台大系列輸注液與其他注射藥品混合後的安定性如何；經與製造廠商連絡後，該廠商提供台大系列輸注液與某些藥物之間混合後的安定性相關資料，目前已將該資料置於本部網頁供查閱參考，查閱步驟如下：

本院藥劑部網站首頁——▶“快速查找“——▶“處方集（含附錄）“
——▶於“二、處方集附錄“項下即可查詢到“TAITA Solution 與他藥之配合變化“

3. 藥物相關專題介紹

3.1 Cetuximab 100mg/50ml/vial

曾淑鈺 科主任

【藥理作用】

Cetuximab為人、鼠片段基因合成的單株抗體（monoclonal antibody），它可專一性地與上皮細胞生長因子接受器（EGFR）結合，競爭性的抑制上皮生長因子的功能，而使得癌細胞不能進行複製、繁殖、血管無法再生，並誘發癌細胞凋亡（apoptosis），不僅可抑制大腸直腸癌細胞的生長，也可增強大腸直腸癌細胞對化學治療藥物的敏感性。2004年2月被美國食品藥物管理局（FDA）核准用來單一或與irinotecan合併治療上皮細胞生長因子接受器（EGFR）陽性，且對以irinotecan為主的化學治療無效的轉移性大腸直腸癌。

初始劑量為400 mg/m²，以2小時的時間緩慢輸注，維持劑量為250 mg/m²，以1小時的時間緩慢輸注，最快輸注速率為5ml/min，最高血中濃度通常在輸注後3小時左右達到，分佈體積為2~3升/平方公尺，半衰期平均為114小時（75~188小時）。所以，cetuximab只要一星期注射一次。

肝功能或腎功能不好的患者也不需特別調整劑量。懷孕等級為C級。

衛生署許可適應症：Cetuximab與irinotecan合併使用，治療經irinotecan細胞毒性治療失敗且具有表皮生長因子接受器表現型的轉移性直腸結腸癌的病患。。

副作用：主要是疲倦和腸胃道反應，如腹瀉、噁心或嘔吐等。有超過80%的病患可能會出現皮膚反應，其中約15%是嚴重反應，它們主要是類似痤瘡的皮疹，和/或一些較少發生的指甲異常（例如：指溝炎）。陽光會惡化皮膚症狀，所以，用藥期間儘量避免暴露在太陽下。

【院內現有單株抗體藥物比較】

	Trastuzumab 440mg	Rituximab 100,500mg	Bevacizumab 100mg	Cetuximab 100mg/50ml/vial
商品名	Herceptin	Mabthera	Avastin	Erbitux
健保給付規定	1. 單獨使用於治療腫瘤細胞上有過度HER2表現，曾接受過一次以上化學治療之轉移性乳癌病人。(91/4/1) 2. 與paclitaxel併用，使用於未曾接受過化學治療之轉移性乳癌病患，且為IHC Test3或FISH(+)者。 3. 經事前審查核准後使用。	1. 限用於復發或對化學療效有抗性之低惡度B細胞非何杰金氏淋巴瘤。(91/4/1) 2. 併用CHOP或其他化學療法用於CD20抗原陽性之B瀰漫性大細胞非何杰金氏淋巴瘤之60歲以上病患。 3. 經事前審查核准後使用。	尚未給付	1. cetuximab 與irinotecan合併使用，治療已接受過含5-fluorouracil (5-FU)、irinotecan 及oxaliplatin二線以上之細胞毒性治療失敗且具有表皮生長因子受體(EGFR)表現型的轉移性直腸結腸癌的病患。 2. 需經事前審查核准後使用，每次申請事前審查之療程以9週為限，再次申請必須提出客觀證據(如：影像學)證實無惡化，才可繼續使用。使用總療程以18週為上限。
健保給付價	61192元/440mg	39600元/500mg 8800元/100mg	17520元/100mg (自費價)	7982元/100mg
劑量	Loading dose : 4mg/kg, IV for 90 min Maintain dose : 2 mg/kg/week for 30 min	每週靜脈注射375mg/m ² ， 首次投與50mg/hr，每30分鐘增加50mg/hr， 最高給藥速度： 400 mg/hr	每次靜脈注射5mg/kg 每兩週注射一次	每週靜脈注射400mg/m ² ，病患第一次輸注前，一定要先給予抗組織胺藥劑，並建議之後的每一次輸注都要先給予抗組織胺藥劑。靜脈每分鐘不可以超過5ml，建議每次輸注時間超過一小時。
院內規定			自費使用	限大腸直腸外科按健保規定使用

4. 醫藥文獻新知摘要選粹

本專欄選自藥劑部及圖書館當期或近期的期刊資料，每期摘要具有臨床啟發性之文章或藥理治療新知等。供醫藥同仁參考，希望有興趣者，多多利用這些期刊。

中文標題：比較兩種治療痛風的藥物febuxostat和allopurinol在患有高尿酸血症及痛風發作的病人身上其安全性和效果。

英文標題：Febuxostat compared with allopurinol in patients with hyperuricemia and gout.

原文出處：The New England Journal of Medicine, 2005;353(23):2450-2461.

摘要內容:

痛風是一種疼痛的關節炎，是因為身體中的尿酸過多所造成，尿酸貯存在關節中造成疼痛、腫脹、發紅、僵硬、發炎；較常發生在男性身上，相關的因素有肥胖、高血壓、高膽固醇、糖尿病等等。Febuxostat，一種新型nonpurine選擇性抑制黃嘌呤氧化酶，是一種潛在的替代嘌呤醇治療高尿酸血症及痛風。在這項研究中，對於兩種治療痛風的實驗性藥物febuxostat和allopurinol，比較其安全性和效果；Allopurinol是用在降低痛風病患體內尿酸的藥物中最常見的藥。

760位痛風患者隨機分配接受治療一年，257位接受febuxostat 80mg/day，251位接受febuxostat 120mg/day，254位接受allopurinol 300mg/day；在研究開始時，所有的參與者血中尿酸濃度超過8.0mg/dl。在第1週至第8週，患者可服用naproxen或秋水仙素進行預防性痛風發作。主要成果是衡量一個在最後3個月每月測量的血清尿酸濃度小於6.0毫克/dl。次要的成果是降低痛風發作的次數和及減少痛風結節的大小。

在研究結束後，研究員發現，接受febuxostat的病患，尿酸降到低於6.0 mg/dl，佔高劑量組的62%，佔低劑量組的53%，而接受allopurinol的病患只有佔21%。服用febuxostat的病患，比起服用allopurinol的病患，明顯降低尿酸。但痛風發作的次數，則三組無明顯差異。156位有痛風結節的病人中，在28週及56週時，與allopurinol組相比，接受febuxostat的病患痛風結節減小的更顯著。

這些參與者的尿酸濃度低於門檻值，比較不會疼痛也比較少痛風發作。各組的副作用都差不多，包括上呼吸道感染、肝功能異常、腹瀉、頭痛。（曾淑鈺科主任）

中文標題：Propylthiouracil 與 methimazole 用於治療懷孕婦女甲狀腺亢進的比較。

英文標題：Propylthiouracil versus methimazole in treatment of grave's disease during pregnancy.

原文出處：The Annals of Pharmacotherapy, 2007; 41 : 1018-1022

摘要內容:

抗甲狀腺藥物可能造成懷孕婦女胎兒甲狀腺機能低下，或引起胎兒畸形。這些藥物會通過胎盤造成胎兒甲狀腺機能低下以及甲狀腺結節，胎兒的甲狀腺約在懷孕五至六週開始發育，濾泡及膠質約在十至十二週產生，所以除非藥物在懷孕十週後開始服用否則對胎兒甲狀腺功能的影響不大。有研究認為propylthiouracil對於胎盤的穿透力低於carbimazole或methimazole，雖然未有定論，不過此藥可能最不會傷害到胎兒的甲狀腺。基本上懷孕時藥物劑量還是愈低愈好，雖然中等量的抗甲狀腺藥物對胎兒的甲狀腺的傷害很小，但懷孕時應避免使用大量的carbimazole，因為為了防止甲狀腺機能低下症常併用thyroxine，而carbimazole對胎盤的穿透力很強，thyroxine則相反，這樣雖然母親甲狀腺功能正常，卻很容易造成胎兒在子宮裡面形成甲狀腺機能低下。而且服用carbimazole及thyroxine的母親所產下的子孫其胎兒不正常的機率遠比單純服用carbimazole者為高。懷孕時所需抗甲狀腺藥物劑量通常會比平時低，有些患者在懷孕中期甚至可以停藥。通常propylthiouracil只要維持每天200毫克以下即可，這種劑量不會引起胎兒甲狀腺腫大或機能低下。另外，懷孕時不可服用 β -blockers如 propranolol，因為會造成胎兒生長遲滯及新生兒呼吸抑制。

過去有數篇病例報告指出服用carbimazole或methimazole的母親所產下的小孩會發生頭皮缺損(aplasia cutis)，食道閉鎖，智能降低等現象。不過大型研究並未顯示如此結果。Propylthiouracil仍是懷孕婦女的首選藥物，除非病患無法耐受PTU，譬如過敏反應，或治療失敗，才考慮使用第二線的carbimazole或methimazole。

有關哺乳方面，因為所有的抗甲狀腺藥物以及碘都會從母乳排出，一般估計propylthiouracil約排出0.07%、carbimazole 0.5%、methimazole 10%，所以需要哺乳時亦建議服用propylthiouracil，不過carbimazole也可以很安全的使用。

(曾淑鈺科主任)

中文標題：**Terbinafine** 在B肝病人導致的急性自體免疫性肝炎。

英文標題：Terbinafine-induced acute autoimmune hepatitis in the setting of hepatitis B virus infection.

原文出處：The Annals of Pharmacotherapy, 2007; 41 :.880-884

摘要內容:

本文描述一位57歲男性台灣人，患有慢性B型肝炎；因患灰指甲開始口服Terbinafine 250mg QD。起初肝功能正常，經12週治療後，出現厭食、疲倦、腹水、黃疸等症狀。該病人並未服用其他藥品、草藥或酗酒，因血液中有暫時性的自身抗體及經肝組織切片診斷確立，停藥3週後，GOT：1282 IU/L、GPT：1044 IU/L、bilirubin：5.9mg/dL、platlet：77×10³ /mm³。Terbinafine導致的肝細胞損害、膽汁鬱積，已有很多報導。但導致急性自體免疫性肝炎則是第一例，是因為病患自身的免疫系統攻擊肝細胞引起發炎或壞死。病患以 vitamin K、diuretics、adefovir 治療，3週後肝功能恢復正常。該病患的B肝抗原可能是致病的病因。(曾淑鈺科主任)

5. 第三十三次藥事委員會決議

第三十三次藥事委員會決議新進藥品如下，將陸續進用：（內容若有錯誤，以藥委會記錄為準）

一、A000004527 Cetuximab Inj 2mg/ml、50ml/vial (商品名Erbitux)，為與irinotecan合併使用，治療經內含irinotecan之細胞毒性治療失敗且具有表皮生長因子受體表現型的轉移性直腸結腸癌的病患藥物；限大腸直腸外科按健保局規定事前審查核准後使用。 Bar code：04527
二、A000004528 Bortezomib Inj. 3.5mg/vial (商品名Velcade)，為治療曾接受過至少一種治療方式且已經接受或不適宜接受骨髓移植的進展性多發性骨髓癌病人藥物；限血液腫瘤科按健保局規定事前審查核准後使用。 Bar code：04528
三、A0000004529 Etoposide cap 50mg (商品名Vepesid)，為抗癌藥物，臨床上被用來作為許多癌症的治療，包括小細胞肺癌、卡波西氏瘤、睪丸癌（生殖細胞癌），急性白血病及淋巴瘤等；限老年及身體較虛弱者使用。 Bar code：04529
四、A000004315 Flutamide tab 250mg (商品名Fuprostate)，為前列腺癌的輔助治療藥物；比照Fugerel限泌尿外科專科醫師以上按健保局規定使用。 Bar code：04315
五、A000021152 Finasteride tab 5mg (商品名Proleak)，為治療良性前列腺增生藥物；比照Proscar限泌尿外科專科醫師以上按健保局規定使用。 Bar code：21152
六、A000012065 Fluticasone propionate Evohaler 50mcg/dose、120does/bot (商品名Flixotide)，為用於預防性治療成人及兒童氣喘；限兒童醫學部用於六歲以下的兒童。 Bar code：12065
七、A000005240 Salmeterol 25mcg + Fluticasone 250mcg/dose複方製劑、120 dose/Evohaler (商品名Seretide)，為用於可逆性呼吸道阻塞疾病(ROAD)之常規治療，包括適合使用支氣管擴張劑及皮質類固醇組合療法之患有氣喘的兒童與成人；比照Serevent Accuhaler限制使用。 Bar code：05240
八、A000007330 Buflomedil HCl tab 150mg (商品名Buflo)，為治療末稍血管循環障礙藥物；比照Lofty1限科並按健保局規定使用。 Bar code：07330
九、A000006404 Pentoxifylline S.R.F.C. tab 400mg (商品名Trenfylline)，為治療末稍血管循環障礙藥物；比照Trental限科使用。 Bar code：06404
十、A000003634 Daptomycin Inj 500mg/vial (商品名 Cubicin)，為治療下列感受性革蘭氏陽性菌的引起的複雜皮膚和皮膚組織感染Staphylococcus aureus (包括methicillin-resistant strains), Streptococcusmpyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae subsp.equisimilis and Enterococcus faecalis (vancomycin-susceptible strains only) 藥物；限成人感染科專科醫師使用。 Bar code：03634
十一、A000011203 Lactulose syrup 666mg/ml, 500ml/bot (商品名Lactul)，為治療患病期慢性便秘、門系肝腦病變、肝昏迷前期、肝昏迷藥物。 Bar code：11203
十二、A000005130 Mebeverine HCl tab 135mg (商品名Mebever)，為治療大腸之機能性痙攣藥物。 Bar code：05130

- 十三、A000013502 Ursodeoxycholic acid cap 300mg (商品名Lipo)，為膽固醇系膽結石之溶解藥物。
Bar code：13502
- 十四、A000003969 Entecavir tab 1mg (商品名Baraclude)，為治療有B型肝炎病毒複製跡象的成人慢性B型肝炎患者藥物；限胃腸科自費病患使用。
Bar code：03969H
- 十五、A000003972 Entecavir tab 0.5mg (商品名Baraclude)，為治療有B型肝炎病毒複製跡象的成人慢性B型肝炎患者藥物；限胃腸科自費病患使用。
Bar code：03972
- 十六、A000007128 Simvastatin tab 40mg (商品名Zolotin)，為治療高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症、降低冠心病患者的心血管事件發生率及冠心病致死率藥物；按健保局規定使用。
Bar code：07128
- 十七、A000007129 Ezetimibe 10mg + Simvastatin 20mg/Tab複方製劑 (商品名Vytorin)，為治療原發性高膽固醇血症，同型接合子家族性高膽固醇血症(HOFH)藥物；按健保局規定使用。
Bar code：07129
- 十八、A000016340 Pioglitazone tab 15mg (商品名Diazone)，為治療第2型糖尿病患者（非胰島素依賴型糖尿病，NIDDM）藥物；限新陳代謝科專科醫師使用、不得跨科使用。
Bar code：16340
- 十九、A000007046 Amiodarone HCl tab 200mg (商品名Amiorone)，為治療WOLFF－PARKINSON－WHITE氏症候群、上室性及心室性心博過速、心房撲動、心房纖維顫動、心室纖維顫動藥物；比照Cordarone限制使用。
Bar code：07046
- 二十、A000007259 Relazide(每錠含 Reserpine 0.1mg、Hydralazine HCl 10mg、Hydrochlorothiazide 10mg) 為一治療高血壓複方製劑。
Bar code：07259H
- 二十一、A000008003 Methylphenidate HCl extended release tab 36mg (商品名Concerta) 為治療注意力不全的過動兒症狀藥物；屬第三級管制藥品，限精神部及兒童醫學部按健保局規定使用。
Bar code：08003B
- 二十二、A000008538 Fludiazepam tab 0.25mg (商品名Flupine) 為治療焦慮狀態、失眠、肌肉痙攣藥物；屬第四級管制藥品。
Bar code：08538
- 二十三、A000008539 Zopiclone tab 7.5mg (商品名Insopin) 為治療失眠症藥物；屬第四級管制藥品。
Bar code：08539
- 二十四、A000020346 Tretinoin 0.5mg + Fluocinolone acetonite 0.1mg + Hydroquinone 40mg/gm Cream, 15gm/tube複方製劑(商品名Tri-Luma) 為臉部中度至重度肝斑之8周內短期治療，合併各項防曬措施(包括使用防曬劑)使用；限皮膚科自費病患使用。
Bar code：20346
- 二十五、A000003973 Metronidazole Vaginal Gel 7.5mg/gm、25gm/tube (商品名Sutrol Gel Vaginal) 為治療細菌陰道炎如Haemophilus vaginitis, Gardnerealla vaginitis, Non-specific vaginitis, Corynebacterium vaginitis或Anaerobic vaginosis 藥物；限婦產部使用。
Bar code：03973
- 二十六、A000016142 Conjugated estrogens 0.3mg + Medroxy- progesterone acetate 1.5mg/Tab複方製劑 (商品名Premelle Lite) 為治療雌激素缺乏引起之中度或重度血管舒縮症狀、預防及治療與雌激素缺乏引起的骨質疏鬆症、萎縮性陰道炎及萎縮性尿道炎藥物；限婦產部自費病患使用。
Bar code：16142

二十七、A000021155 Sevelamer HCl tab 800mg (商品名Renagel)為適用於控制接受長期血液透析治療的成年尿毒症患者的高磷血症藥物；限腎臟科洗腎病患自費使用。 Bar code：21155
二十八、A000008419 Oxcarbazepine oral suspension 60mg/ml, 100ml/bot (商品名trileptal)為成人局部癲癇發作之單一或輔助治療，大於一個月孩童癲癇局部發作之輔助治療藥物；限兒童醫學部使用。 Bar code：08419
二十九、A000009066 Etoricoxib tab 60mg (商品名Arcoxia)為治療骨關節炎(OA)與類風濕關節炎(RA)之表徵與症狀的急慢性治療、治療急性痛風性關節炎、治療原發性經痛藥物；比照Celebrex限科且按健保局規定使用。 Bar code：09066
三十、A000009067 Paracetamol (Acetaminophen) tab 500mg (商品名Paramol)為解熱、鎮痛藥物。 Bar code：09067
三十一、A000015018 Deferasirox Dispersible tab 125mg (商品名Exjade)為治療因輸血而導致慢性鐵質沈著症(輸血性血鐵質沉積)的成年人及2歲以上兒童患者藥物；限血液腫瘤科按健保局規定使用。 Bar code：15018
三十二、A000021153 Azathioprine tab 50mg (商品名Azapress)為腎臟移植手術防止排斥作用的輔助治療法、全身性紅斑狼瘡、重度風濕性關節炎、急、慢性白血病藥物。 Bar code：21153
三十三、A000021141 Cyclosporine cap 25mg (商品名Gengraf)為預防器官移植及骨髓移植後之移植排斥，預防移植反宿主疾病，活動性有失明危險之中部或後部非感染性葡萄膜炎，使用傳統療法無法控制者，BEHCT病一再發炎，且已侵犯視網膜者，替代性療法無效或不適用之嚴重乾癬；標準療法無效或不適用之嚴重類風濕性關節炎；以類固醇治療無效或對類固醇有依賴性的原發性腎病症候群（活體檢視「BIOPSY」主要為微小病變疾病或局部環節腎絲球硬化症），經細胞穩定（CYTOSTATIC）治療無效且腎功能指數在正常值50%以上之病人藥物；比照Cyclosporine (Neoral)按健保局規定專案申請使用。 Bar code：21141H
三十四、A000021142 Cyclosporine cap100mg (商品名Gengraf)為預防器官移植及骨髓移植後之移植排斥，預防移植反宿主疾病，活動性有失明危險之中部或後部非感染性葡萄膜炎，使用傳統療法無法控制者，BEHCT病一再發炎，且已侵犯視網膜者，替代性療法無效或不適用之嚴重乾癬；標準療法無效或不適用之嚴重類風濕性關節炎；以類固醇治療無效或對類固醇有依賴性的原發性腎病症候群（活體檢視「BIOPSY」主要為微小病變疾病或局部環節腎絲球硬化症），經細胞穩定（CYTOSTATIC）治療無效且腎功能指數在正常值50%以上之病人藥物；比照Cyclosporine (Neoral)按健保局規定專案申請使用。 Bar code：21142G
三十五、A000009064 Tiaprofenic acid tab 200mg (商品名Suroten)為Propionic Acid類消炎、鎮痛藥物。 Bar code：09064F
三十六、A000009063 Indomethacin Spray Solution 7.5gm/gm, 20ml/bot (商品名Sulon)為暫時緩解局部疼痛藥物；限復健科使用、一個月內限開兩瓶。 Bar code：09063G
三十七、A000007122 Amlodipine tab 5mg (商品名Nobar)為治療高血壓、心絞痛藥物。 Bar code：07122I
三十八、A000007246 Fosinopril sodium tab 10mg (商品名Fonosil)為治療高血壓、心衰竭藥物。 Bar code：07246D

三十九、A00005318 Tamsulosin HCl SR cap 0.2mg (商品名Tamso SR) 為治療前列腺肥大症(增生)所伴隨的排尿障礙藥物；限泌尿外科使用。 Bar code : 05318J
四十、A000021140 Disodium Clodronate cap 400mg (商品名Sinclote) 為治療惡性腫瘤之蝕骨性骨頭轉移，惡性高血鈣症藥物；按健保局規定使用。 Bar code : 21140I
四十一、A000016338 Acarbose tab 50mg (商品名Glibose) 為非胰島素依賴型糖尿病之治療藥物；按健保局規定使用。 Bar code : 16338
四十二、A000013445 Aprepitant cap 80mg (商品名Emend) 為與其他止吐藥劑併用，可以防止由高致吐性及中致吐性癌症化療藥物在初次或重覆使用時所引起的急性或延遲性噁心與嘔吐藥物；按健保局規定使用。 Bar code : 13445
四十三、A000013446 Aprepitant cap 125mg (商品名Emend) 為與其他止吐藥劑併用，可以防止由高致吐性及中致吐性癌症化療藥物在初次或重覆使用時所引起的急性或延遲性噁心與嘔吐藥物；按健保局規定使用。 Bar code : 13446
四十四、A0000021154 Montelukast Film coated Tab (商品名Singulair) 10mg，用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀，及防止運動引起的支氣管收縮；緩解成人及小兒的日間及夜間過敏性鼻炎症狀。 Bar code : 21154

決議刪除品項

03404	Ampicillin cap 250mg
16201	Chorionic Gonadotropin HM 2000IU (Profasi)
03923	Indinavir cap 200mg (Crixivan)
03943	Indinavir cap 400mg (Crixivan)
13105	Nizatidine cap 150mg (Tazac)
13435	Tropisetron cap 5mg (Navoban)
03324	Cefonicid Inj. 1gm/vial (Lisa)
16208	Follitropin beta 600IU/0.72ml/vial (Puregon)
11391	Moriamin-SN 10% 1000ml/bot
11159	Hemodialysis Solution 300GB 10L
11160	Hemodialysis Solution 300GB 3.8L
11161	Hemodialysis Conc. No.11 10L
11162	Hemodialysis Conc. No.11 3.8L
11163	Hemodialysis Conc. No.7 10L
11164	Hemodialysis Conc. No.7 3.8L
11165	Hemodialysis Conc. No.8 10L
11166	Hemodialysis Conc. No.8 3.8L
11167	Hemodialysis Conc. No.9 10L
11168	Hemodialysis Conc. No.9 3.8L
11833	CAPD-3 4.25% 1.5L
04510	Irinotecan Inj. 40mg/2ml/vial
04412	Paclitaxel Inj 6mg/ml、30mg/5ml/vial (Genetaxyl Crem Less)
04305	Flutamide Tab 250mg (Fugerel)
05223	Salmeterol Xinafoate (Serevent Accuhaler)
07312	Buflomedil HCl (Loftyl) Tab 150mg
06401	Pentoxifylline SR Tab 400mg (Trental)
11201	Lactulose Liquid (Duphalac)
05120	Mebeverine HCl Tab 100mg (DUSPATALIN)
07001	Amiodarone HCl Tab 200mg (Cordarone)
16132	Premelle 5 Tab(Premarin+MPA)
21002	IMURAN TAB 50MG(AZATHIOPRINE)
07221	Fosinopril Sodium Tab 10mg (Monopril)
05312	Tamlosin S.R. Cap 0.2mg (Tamsulosin HCl)
21054	Clodronate Disodium Cap 400mg (Bonefos)