


科別	藥劑部	編號：6100004
主題	耳用滴劑的正確使用方法	101.11.14 訂定
製作單位	藥劑部	一修
		101.11.16 審閱

「一般說明」

1. 用肥皂及清水充分清潔雙手。
2. 儘可能請他人幫忙給藥(避免自己投予時，瓶口碰到耳壁而污染)。
3. 將製劑握於手中，使溫度達到室溫，若將冰冷藥液直接滴入，可能造成暈眩。
4. 若製劑是懸浮劑，使用前要搖勻。用乾淨紙擦淨瓶口前端。
5. 側面躺下或頭側傾，使須給藥的耳朵朝上。
6. 為了讓藥液流進去，成人要將耳朵往上後方拉，而小孩要往下後方拉。(使耳管

變直)



7. 將藥液數滴依醫師指示，滴在外耳道，不需太伸入。
8. 耳朵保持傾斜，維持原姿勢靜躺 2 分鐘，過多的藥水不可用乾棉花擦，而是用沾了藥液的棉球輕輕塞入，以免耳內藥液被乾棉花吸走。

「注意事項」

1. 不要讓水流入耳內，也不要用水清洗滴管。用紙巾清潔滴管。

2. 不要冷藏，除非有特別指示。
3. 不可使用變色或有異味的製劑。
4. 如果忘記使用，想起時可儘快補用，但若想起時間已接近下次點藥時間，則略過一次劑量，千萬不要一次給予兩次劑量。

「何時找醫師」

若病情持續或更糟、給藥後耳道癢或有燒灼感，應儘快讓醫師知道。

備註：每年修訂或審閱乙次。

警語：所有衛教資訊內容僅供參考使用，無法取代醫師診斷與相關建議，若有身體不適，請您儘速就醫，以免延誤病情。