



高雄榮總藥劑部用藥指導講座課前問卷

此問卷只供作評量教學研究是設計來幫助我們了解更多有關課程教學成效評量等問題，以作為提供改善與進步的參考。您的回答只供作研究之用，不會帶給任何個別的影響，也不會透露任何個人姓名出現在最後報告中，請安心作答。

謝謝您的合作。

高雄榮總藥劑部 敬上

請填寫粉紅色問卷，謝謝

個人基本資料

用藥指導課前問卷

1. 姓名 _____
2. 性別 (1) 男 (2) 女
3. 年齡 _____ 歲

1. 請問您，對『止痛藥』的正確用法是否了解？ 是 否
2. 請問您，對用藥五大核心的概念是否了解？ 是 否
3. 請問您，對『止痛藥』的安全性是否了解？ 是 否
4. 請問您，對『止痛藥』的有效性是否了解？ 是 否



痛

干擾你的生活嗎？

高雄榮民總醫院藥劑部

用藥核心能力是…

清楚表達身體狀況

看清藥品標示

清楚用藥方法、時間

做身體的主人

與藥師醫師做朋友





表達自己的身體狀況

2



3


哪裡痛呢？



4



表達您的疼痛程度



4



如何正確用藥？



5

行政院 國軍退除役官兵輔導委員會 高雄榮民總醫院
Kaohsiung Veterans General Hospital
386 Ta-Chung 1st RD, Kaohsiung, Taiwan 813 ROC

領藥號: 3430 藥袋數: 2 / 4

姓名: [Redacted] 病歷號: [Redacted] 性別: 男
Name: [Redacted] Record Number: [Redacted] Sex: Male
調劑日期: 20130506 15:35 年齡: [Redacted]
Date of Dispense: Age:

用法: 口服 每次: 1 粒
Administration: Each Time: 1 Tablet
早、午、晚各一次 用法、用量

藥名: Meitan Tab 25mg (Diclofenac Pot. (Diclofenac Potassium)) 發藥量: 42 粒 天數: 14 用藥天數
Medicine: Quantity: Duration:
漢疹膜衣錠 藥物名稱、成分

藥品外觀: 圓形 (標記: MB) 藥物外觀

主要適應症: 消炎止痛藥 藥品適應症

用藥須知或警語: 不可飲酒。有胃痛或過敏反應時應告知醫師。 注意事項

主要副作用: 消化性潰瘍、皮疹、腹痛、腹瀉、消化不良 副作用

處方醫師: 張昇宙 調劑藥師: 盧貞秀 核對藥師: [Redacted]
Physician: Dispensed by R.Ph. Checked by R.Ph.
科別: 21 胸腔外科下午 Department

服用指示:
1. 睡前: 晚上睡前半小時。
2. 飯前: 飯前半小時至一小時。
3. 飯後: 飯後半小時至一小時。
4. 空腹: 進食前1小時或進食後2小時。
5. 未註明飯前、飯後、空腹: 表示均可。

注意事項:
1. 藥品取用後, 請將尚未使用之藥品立即放回原藥袋, 並保留藥袋至藥品用完。
2. 藥品應置乾燥陰涼處, 須冷藏藥品請存放冰箱內(勿冷凍)。如發現變質、變色、不可再使用。
3. 藥品不可讓孩童拿到, 也不可送給他人服用, 以免發生意外。
4. 請遵照醫囑, 勿擅自增加藥量或停藥, 並按時回診。
5. 用藥如有疑問, 請採取藥地點撥電話查詢本院總機(07)3422121轉中央藥局: 6100 門診藥局: 6111 急診藥局: 4819 藥事照顧或藥物資訊中心: 6114或6104 服務時間: 8:30-12:00, 13:30-17:30 藥劑部網址: www.vghks.gov.tw/ph/in

用藥方式
睡前: 晚上睡前半小時
飯前: 飯前半小時至一小時
飯後: 飯後半小時至一小時
空腹: 進食前1小時或進食後2小時

本院總機(07)3422121
門診藥局: 6101,6111
藥事照護或藥物諮詢: 6114,6104

1. 多一分謹慎小心, 多一分安全。
2. 接到詐騙電話, 一定要掛斷。
3. 查覺任何詐騙行為, 立即報警。
- 正當使用合法藥物, 造成嚴重疾病(住院、障礙或死亡), 得申請藥害救濟; 請聯絡財團法人藥害救濟基金會, 電話: 02-23584097-

Person(s) who have sustained drug hazards: adverse reactions to pharmaceuticals leading to death, impediment (disability) or serious illness (hospitalization) caused

止痛藥分類介紹

分類	作用	常見藥品
一般外用貼布軟膏	消炎止痛, 外用或內服、緩解局部或全身性疼痛。	伏斯加凝膠、痛立平軟膏、思舒凝膠
一般口服止痛藥		漢疹膜衣錠 勞寧膠囊 希樂葆膠囊 利菲炎膜衣錠 艾斯美特膠囊 痛立安長效膠囊 壓克痛錠 骨敏捷錠 痛停錠 免你痛錠 疼立解膜衣錠
嗎啡類止痛藥	含嗎啡成分, 麻醉止痛效果強	硫酸嗎啡長效膜衣錠、默痛舒持續性藥效膠囊、頓痛特膠囊、服安痛膜衣錠

外用止痛藥膏

伏加斯凝膠



痛立平乳膏



思舒酸痛凝膠



- 薄薄一層, 塗抹於疼痛處
- 不可內服, 勿接觸眼睛
- 若皮膚有刺激感或不適停止使用

外用止痛貼布



氟比洛芬貼布“漁人”



有痛時使用，外用貼於疼痛處，若皮膚出現紅疹或搔癢情形，先停止使用

10

口服止痛藥



利菲炎膜衣錠



艾斯美特膠囊



百炎錠



炎得淨膠囊




痛停錠



藥物可以飯後服用
可減少腸胃不適情形

11

萬克適錠



骨敏捷錠



希樂葆膠囊



適用於腸胃較敏感的病人

12

壓克痛錠



立止炎膠囊



懷孕或準備懷孕的
婦女不可使用

不可長期
使用

13



普除痛錠

新日期:2012/11/16



漠疼膜衣錠



- 藥效較溫和
- 同時具有解熱的作用



弛刻達膠囊

肌痛膠囊




同時含有止痛效果
和肌肉鬆弛緩解效果




口服長效藥

莫痛緩釋膜衣錠




拿百疼長效持續緩釋錠



緩釋、持續性錠劑
為長效作用，不可剝半

艾雷克持續性藥效錠



痛立安長效膠囊



口服止痛顆粒劑

貝科欣散



- 可直接配水服用或泡入水中飲用。
- 分為全劑量線和半劑量線。
- 避免長久暴露於日曬之下。
- 使用後不可飲酒。

口服止痛管制藥

妙而通錠



及通安錠



頓痛特膠囊



含管制藥成分
未使用完且不再使用
藥品應繳回醫院

18



口服止痛管制藥

長效作用
不可破壞劑型

- 可能會有便秘的情形
- 含嗎啡管制藥成分
未使用完且不再使用
藥品應繳回醫院

硫酸嗎啡長效膜衣錠



嗎啡長效膜衣錠



19



外用止痛管制藥貼布

多瑞喜穿皮貼片劑



吩坦尼穿皮貼片劑 25 微公克



- 確實填寫用藥紀錄表
- 貼於胸前、後背、上臂
或大腿，避開傷口
- 每片可作用72小時
- 使用期間可以洗澡
- 避免泡溫泉或用熱水沖洗

20



8

吃藥不可配酒、茶葉~



21

做自己身體的主人



22

和醫師藥師做朋友



23

藥物諮詢窗口



有任何藥物使用上的問題，都可以來這裡詢問藥師哦!!!




24

藥事照護室



更進一步藥物相關問題，還有為您量身打造的藥事照護室哦!!!



聯絡方式：(07) 3422121
門診藥局：6111, 6101
藥事照護或藥物諮詢 6114, 6104

有獎徵答



Q1：服用止痛藥前要注意什麼呢？

- (1)認清藥物外觀
- (2)看清藥物使用方法
- (3)遵循藥袋上的指示
- (4)以上皆是**



麻煩大家填寫藍色問卷~

高雄榮總團體術教指導講座課後問卷

此問卷只供作評量教學研究是設計來幫助我們了解更多有關課程教學成效評量等問題，以作為提供改善與進步的參考。您的回答只供作研究之用，絕不會給出您的姓名，且不會將個人或姓名與您的回答連結起來。
謝謝您的合作。

高雄榮總藥劑部 敬上

個人基本資料

用藥指導課後問卷

1. 姓名 _____
2. 性別 (1) 男 (2) 女
3. 年齡 _____ 歲

1. 請問這次的主题是否符合您的需求? 是 否
2. 請問這次的內容是否淺顯易懂? 是 否
3. 請問您，是否知道為何要服用這類藥物? 是 否
4. 請問您，對『止痛藥』的正確用法是否了解? 是 否
5. 請問您，對『用藥五大核心』的概念是否了解? 是 否
6. 請問您，本次活動能否增進您對藥物之了解? 是 否



Q2：看醫生的時候要說什麼呢？

- (1) 哪個地方不舒服
- (2) 什麼時候開始不舒服的
- (3) 告訴醫生正在吃的中藥或保健食品
- (4) 以上皆是



Q3：哪個是用藥核心能力？

- (1) 清楚和醫生表達自己的身體狀況
- (2) 看清楚藥袋標示，按時服用
- (3) 生病找醫師，用藥找藥師
- (4) 以上皆是



用藥核心能力是…

清楚表達身體狀況

看清藥品標示

清楚用藥方法、時間

做身體的主人

與藥師醫師做朋友



Q4：有用藥的問題可以找誰呢？

- (1) 藥師
- (2) 隔壁鄰居
- (3) 便利商店店員
- (4) 大法師

Q5：下列哪個止痛藥不能剝半？



(1) 妙而通錠



(2) 骨敏捷錠



(3) 痛停錠



(4) 艾雷克持續性藥效錠



感謝您的聆聽
高雄榮總關心您

止痛藥物用的好
健康生活沒煩惱

