

科別	藥劑部	編號：6100008
主題	肛門栓劑的正確用藥使用方法	101.11.14 訂定
製作單位	藥劑部	一修
		101.11.16 審閱

「一般說明」

1. 以肥皂及清水充分清潔雙手。
2. 將陰道栓劑外包裝去除。
3. 如有需使用半粒，請以乾淨刀片平均切開。
4. 躺下背部露出，伸直下面的腿，上面的腿向腹部彎屈。
5. 用一手把屁股拉上，使肛門口露出。



6. 以手指將栓劑較尖的一端由肛門口向直腸推進約 5 公分，並用手捏住兩邊臀部，以免栓劑脫出。
7. 保持原來姿勢躺 15 分鐘。
8. 使用後，再用肥皂及清水充分清潔雙手。

「注意事項」

1. 栓劑應防潮，保存在小孩不易拿到及陰涼處。

2. 若天氣較熱或存放於較熱處，以致栓劑變軟無法塞入時，可將放置冰箱冷藏約 30 分鐘，或除去外包裝前置於冷水使其變硬。

「何時找醫師」

若使用後病情惡化或癢、刺激感時，應儘快讓醫師知道。

備註：每年修訂或審閱乙次。

警語：所有衛教資訊內容僅供參考使用，無法取代醫師診斷與相關建議，若有身體不適，請您儘速就醫，以免延誤病情。