



高榮藥物不良反應小組通告

日期: 99/09/08

主旨	摘錄食品藥物管理局公告之藥物安全警訊
說明	<p>1. 衛生署於 2010 年 7 月 15 日召開藥物安全評估委員會，對於糖尿病治療藥物 Rosiglitazone (Avandia) 決議，摘要如下：</p> <p>(1) Avandia 不可作為糖尿病患者之第一線治療之選擇，只有當病人對其他降血糖藥品單獨治療或合併治療均無法良好控制時，才可選擇使用本藥品。</p> <p>(2) 不建議使用於缺血性心臟病之病人。</p> <p>(3) 不建議使用於心臟衰竭症狀之病人。</p> <p>(4) 心臟衰竭狀態第 3 級或第 4 級（紐約心臟協會『NYHA』Class III 或 IV cardiac status）的病人禁止使用本藥品。</p> <p>2. 8 月份藥物安全警訊</p> <p>(1) daptomycin 可能引起罕見嚴重之肺部嗜伊紅血症相關的過敏反應，症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促、呼吸困難等。</p> <p>(2) lamotrigine 可能發生嚴重但罕見的無菌性腦膜炎；大部分發生於用藥後 1 至 42 天，出現頭痛、發燒、畏寒、頸部僵硬、噁心、嘔吐、出疹、畏光等症狀且無法找出其他可能導致腦膜炎發生的因素，可能係所引起。</p> <p>(3) 長期使用巴金森氏症藥品 Stalevo®（含 entacapone、carbidopa 及 levodopa 三種成分之複方製劑），可能會增加罹患心臟血管疾病之風險，對於有缺血性心臟病，嚴重心血管疾病的病人，治療需小心。有心肌梗塞病史的患者，其仍殘餘有心房、心結或心室之節律不整，在開始劑量調整期間，必須特別小心監測心臟功能。</p>