

高質服務
雄心創新
榮耀生命
總歸愛心

發行人 曾碧萊
總編輯 毛志民
編輯 陳淑梅、李建立
出版 高雄榮民總醫院藥劑部
網址 www.vghks.gov.tw/ph

103

1981年10月創刊 GPN 4908100246 2009年8月第18卷第4期

本期內容

用藥安全資訊

✖ Leucotriene modifiers安全資訊

✖ Xolair安全資訊

藥物諮詢問答

✖ 含Dextropropoxyphene成分藥品安全資訊

✖ 用於Acetaminophen中毒之解毒藥物

✖ Actein Effervescent Tab與N-Acetyl-L-Cysteine Powder異同

✖ 須儲放於冰箱之藥品有哪些

✖ 女性青春痘治療之荷爾蒙藥品

藥學專題報告

✖ 羥乙基澱粉製劑的介紹

新藥進用品項

✖ 37次藥事委員會通過品項

I. 用藥安全資訊

I.1. Leucotriene modifiers 安全資訊

Leucotriene modifiers (包括 Montelukast (藥品名稱 Singulair)、Zafirlukast (藥品名稱 Accolate)、Zileuton (藥品名稱 Zyflo) 是用於治療氣喘的藥品，根據美國上市後不良反應通報，發現有疑似使用該些藥品而致神經精神學方面的不良事件發生，包括煩躁不安、侵犯行為、焦慮、妄想錯覺、異常夢境、失眠、易怒、坐立不安、甚至有自殺傾向或行為等，倘若病人服藥期間有任何前述之不良反應現象出現，應立即回診開立處方之醫師，應考慮停止繼續使用該類藥品。

衛生署核准含 Montelukast 成分藥品仿單之上市使用經驗記載「曾有病患服用 Singulair 後出現夢境異常、幻覺、昏昏欲睡、頭暈、心理性肌肉運動的過度活躍(包括易怒、躁動、侵略性行為、坐立不安、顫抖、沮喪甚至自殺之想法和行為…)」。另外核准含 Zafirlukast (Accolate)，所核適應症為：「治療支氣管性哮喘」，所核准的藥品仿單中記載失眠為常見可預期之不良反應。全國藥物不良反應通報中心資料，曾有病人疑似使用 Montelukast 藥品導致做惡夢的不良反應，並無自殺方面的不良反應通報案例。(毛志民藥師整理)

I.2. Xolair 安全資訊

Xolair (Omalizumab, 樂無喘) 為一單株抗體製劑，僅適用於證實為 IgE 媒介型的氣喘病人。使用 Xolair 試驗組發生心血管及腦血管不良反應之比例較高，尚未能確認此藥物與此不良反應之關係，目前不建議病患停用 Xolair，但提醒醫療人員及患者應注意有關此藥物之不良反應最新訊息。(毛志民藥師整理)

I.3. 含 Dextropropoxyphene 成分藥品安全資訊

歐盟 European medicines Agency 評估止痛藥中 Dextropropoxyphene (DXP) 成分藥品之風險效益。依據現有資料分析，顯示含有 DXP 成分之止痛製劑並沒有比其他止痛劑（例如 Paracetamol 或 Ibuprofen）**更安全有效**，但是過量使用卻有危及病人生命之風險；因此，建議歐盟各會員國將 DXP 藥品撤離市場。

全國藥物不良反應通報中心資料，並無過量使用 Propoxyphene 成分藥品導致死亡之不良反應通報案例。衛生署核准之含 Propoxyphene 成分藥品均屬管制藥品，相對於國外同類藥品之管理比較嚴格，為病人處方含 Propoxyphene 成分藥品時應審慎評估其治療劑量，切勿超過仿單記載之治療劑量，以防危及病人生命安全。（毛志民藥師整理）

本主題節錄自衛生署發布之用藥安全資訊，以提醒本院同仁用藥時留意。當醫療人員或病患疑似因為使用（服用）藥品導致不良反應發生時，請立即於"線上藥物不良反應通報系統"通報，本院藥物不良反應相關訊息請參考藥劑部網頁。

II. 藥物諮詢問答

II.1. 本院使用於 Acetaminophen 中毒之解毒藥物？

Actein Effervescent Tablets 600mg。

Acetylcysteine (N-Acetylcysteine; NAC; N-Acetyl-L-Cysteine) 為本品之活性成分。本品衛生署核准之適應症為減少呼吸道黏膜分泌的黏稠性，蓄意或偶發之 Acetaminophen 中毒之解毒。NAC 具有直接抗氧化作用，它提供一個能與親電子的氧化基團相互發生作用的自由硫氫基(-SH)。NAC 能阻止次氯酸(HOCL)對 α 1-antitrypsin 和 elastase 的破壞，使得本品對於急性和慢性的呼吸系統感染所引起濃稠性及化膿性分泌有極佳之功效。NAC 之分子結構能透過細胞膜，在細胞中分解成 L-cysteine，而 L-cysteine 為合成 glutathione 的主要成分。NAC 在維持體內有足夠 L-cysteine 之平衡中，扮演重要的角色，而 L-cysteine 有助於保護細胞，使細胞免受於有毒物質藉著不斷消耗 L-cysteine，所產生之細胞毒性作用，如 Acetaminophen 中毒的情況。本品每錠含 Acetylcysteine 600mg，使用於 Acetaminophen 中毒，起始劑量 140 mg/kg，爾後每 4 小時給予 70 mg/kg 共 17 次，可依實際情況換算本品劑量給予。本品為發泡錠，可置於玻璃容器中，加水溶解或攪拌混勻，直接飲用。因本品含有 aspartame，故苯酮尿患者不宜使用。本品可能有硫臭味，並非代表產品變質，此乃製劑中含有活性成分的一種特徵。

參考資料：

1. Acetylcysteine, DrugPoint® Summary, MICROMEDEX.
2. Actein® 藥品說明書

II.2. 本院 Actein Effervescent Tab 與 N-Acetyl-L-Cysteine Powder 臨床使用之異同？

藥物	Actein Effervescent Tab (Acetylcysteine) 600mg/TAB	N-Acetyl-L-Cysteine Powder (Acetylcysteine)
規定		
健保給付	有	無(需自購)
衛生署核可適應症	減少呼吸道粘膜分泌的粘稠性、蓄意或偶發之 Acetaminophen 中毒之解毒劑。	無。*
用藥須知	飯前或飯後服用皆可。 將發泡錠置於飲水容器中，加少量的水溶解，混合均勻後直接飲用。	無
預防顯影劑誘發之急性腎衰竭(off label use)	需自購	
	依不同研究，建議用法不同。口服用法多數研究採用檢查前後各口服 600 mg bid。	

*臨床上做為 Acetaminophen 中毒之解毒劑。

參考資料：

1. Actein Effervescent 說明書。
2. Tepel M, Zidek W. N-Acetylcysteine in nephrology; contrast nephropathy and beyond. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2004;13(6):649-654..

II.3. 本院須儲放於冰箱之藥品有哪些？

請至本院藥劑部首頁>藥學百科>用藥安全>下載「必須冷儲藥品」檔案。

一般冷藏溫度 2℃ – 8℃；短暫可接受溫度在 0℃ – 15℃間，且短暫的高溫數值不可超過 25℃。

參考資料：

1. 藥物說明書。
2. General notices.USP 31。

II.4. 本院是否有可使用於女性青春痘治療之荷爾蒙藥品？

Diane-35 S.C. Tab (黛麗安糖衣錠)。健保給付價 178.5 元。

Diane-35 每盒 21 錠，每錠含 cyproterone acetate 2.0mg 及 ethinylestradiol 0.035mg。

Cyproterone 具黃體素及抗雄性素活性，故 Diane-35 可用於治療婦女因雄性素作用導致的疾病，例如青春痘，特別是明顯並伴有脂漏性皮膚炎的青春痘，或形成結癬（青

春痘丘疹膿包，結囊)者及溫和型多毛症。本品衛生署核准之適應症為痤瘡，皮脂溢出，多毛症，避孕(須注意若使用於避孕，健保不支付)。另補充本院其他複方荷爾蒙藥品之成分及衛生署核准適應症(附表一)。注意除自購外，荷爾蒙製劑之使用須符合健保給付規定通則(附表二)

附表一、本院其他複方荷爾蒙藥品

英文藥名	Activelle	Indivina	Progyluton	Premelle Lite
成分	每錠含 Estradiol 1mg 與 Norethindrone Acetat 0.5 mg	每錠含 Estradiol valerate 1mg 與 Medroxyproges terone acetate 2.5mg	每顆白色糖衣錠含 estradiol valerate 2mg；每 顆淺褐色糖衣錠含 estradiol valerate 2mg 及 norgestrel 0.5mg	每錠含 conjugated estrogens 0.3mg 與 medroxyprogeste rone acetate 1.5mg
中文藥名	雅利妃錠	順寧娜錠	普吉樂通糖衣錠	普美來錠
衛署核准 適應症	停經超過一年以上婦女之雌激素缺乏引起的症狀、停經婦女骨質疏鬆症之預防。	停經婦女雌激素不足所引起之諸症狀。	荷爾蒙補充療法，用於治療保有完整子宮的婦女，因自然停經或性腺功能低下、卵巢切除或原發性卵巢衰竭引起之雌激素缺乏癥候。預防停經後之骨質疏鬆。調節不規則的月經週期。原發性及次發性無月經症候之治療。	雌激素缺乏引起之中度或重度血管舒縮症狀、預防及治療與雌激素缺乏引起的骨質疏鬆症、萎縮性陰道炎及萎縮性尿道炎
健保價	162.4 元(/盒)	7.9 元(錠)	87.36 元(盒)	需自購

附表二、全民健康保險藥品給付規定通則：全民健康保險使用荷爾蒙之醫治病症

藥品名稱	適應症
女性荷爾蒙	閉經、不孕症、乳癌、前列腺癌、子宮機能性出血、停經後荷爾蒙之補充、腦下垂體疾病引起之無經症、有症狀之更年期症候群
黃體荷爾蒙	流產、子宮機能性出血、不孕症、乳癌、子宮內膜異位、停經後婦女
男性荷爾蒙	乳癌、子宮機能性出血、再生不良性貧血、血小板低下症、腦下垂體功能不足

參考資料：

1. 各藥品說明書
2. 全民健康保險藥品給付規定通則，中央健康保險局網站。

III. 藥學專題報告

羥乙基澱粉製劑的介紹

杜書卿藥師

外科、創傷科及加護病房裡的病患，常發生血液容積過低的情況，可能因外傷或手術過程中大量血液流失，或因嚴重感染造成血管舒張及血管內皮障蔽通透性改變，血液大量擴散入組織間隙所造成；此時緊急的處理方式，便是先提供大量輸液來維持血管內的血液容積，以防止低血壓、周邊灌流不足的情形進一步惡化，引發器官衰竭的情形出現。輸液分為兩大類，一種為血液製品，如全血、血漿蛋白；另一種為非血液製品，包括晶質液(Crystalloid)如 Lactic Ringer solution，食鹽水，如 Dextran、Gelatin 膠質液(colloid)、和羥乙基澱粉(Hydroxyethyl starches, HES)製劑。

HES 製劑是由天然多醣體 – Amylopectin – 所衍生合成的膠質液，Amylopectin 為一種高度支鏈型澱粉，可由馬鈴薯或黏質玉米取得，所衍生之製劑依其原料來源、分子量大小、取代基多寡及鍵結方式不同，使得在體內的分佈、代謝及排除上有所差異；基本結構是由右旋葡萄糖單體所組成之葡萄糖複合體，主要以 1-4 鍵結少數以 1-6 支鏈鍵結方式連結（20 個單體約有 1 個支鏈）。天然取得之澱粉無法用來作為血容積擴張劑，乃因血液中的胰蛋白酶會在極短的時間內將其水解而失去膠體作用；若將其中的羥基取代為羥乙基，可增加溶解度並減緩其被水解的速度。羥乙基化主要位在無水葡萄糖殘基的 C2、C3 及 C6 上，其中 C2 位置羥乙基化比例愈高在血液中的半衰期就愈長，另外分子量愈高或取代基愈多也是減緩其排除速率的方式¹。

一般依其取代基的數量可分為四類，Hetastarch、Hexastarch、Pentastarch、及 Tetrastarch，其取代基比例分別以 0.7、0.6、0.5、0.4 為分界；第一代的 HES 製劑屬於高分子量（大於 450kD）、高取代基（大於 0.7），報告顯示對於血液凝集有不良的影響，增加出血的機會；研究中指出此類製劑會減低凝血因子 VIII 的活性、減少 von Willebrand factor 影響血小板功能，美國 FDA 因此不建議此類製劑用於心臟手術進行體外循環的病患²；爾後研發的第二、三代的 HES 製劑則逐漸減低分子量至 200kD、130kD，取代基比例也降為 0.5、0.4，此種改變在血液凝集上的副作用也有逐漸改善的情形。Kozek-Langenecker 等人搜尋自 1988-2006 年之間的前瞻性隨機對照試驗，擷取其中 7 篇共 449 名病患，匯整其手術開始後 24 小時內的病患資料，比較投與 6% HES 130/0.4 (Voluven®) 及 6% HES 200/0.52 (HAES-steril®) 兩種輸液，在其血液的流失量、引流量、計算後的血液流失量及紅血球輸血量之間的差異，結果顯示輸注 6% HES 130/0.4 的族群在統計學上都有明顯的減低³。雖然仍有部分研究結果顯示，HES 製劑在血液凝集方面的副作用仍不能完全排除，但其安全性已因製劑的改良而有明顯改善。

此外，HES 製劑使用於腎臟功能不佳的病患也需特別注意，推測其原因可能與高膠

質壓的膠質液類似，當病患處於脫水狀態又投與高劑量的輸液時，會造成高黏稠度的尿液，使得腎小管的流動阻滯造成阻塞，導致腎臟的損傷，但目前仍無法排除製劑本身對腎臟直接傷害的可能性；Wiedermann 進行系統性回顧研究，收集 12 篇隨機對照研究共 1062 名病患，結果顯示 HES 製劑在腎臟方面的副作用較其他對照組（包括白蛋白溶液、Gelatin 及晶質液）有明顯增高的情形，尤其是高劑量投與的時候⁴；為了檢驗第三代的 HES 製劑在此方面的影響，Boldt 等人對年齡大於 80 歲、進行心臟手術的 60 名病患，隨機分為兩組，比較使用 HES 130/0.4 及 Gelatin 在腎功能方面的影響，結果顯示 HES130/0.4 對腎臟的影響低於 Gelatin⁵。

第三代的 HES 製劑，有較快的腎排除率及較少的體內蓄積量⁶，每日輸注總量也由 20mg/kg（10% HAES-Steril）提高至 50mg/kg（6% Voluven），因此，大大的提高使用的安全性，但仍需注意每日輸注總量的限制，及不同 HES 製劑之間的差異；雖然目前低血容量時該使用何種代用血漿為優仍具爭議，但新一代的 HES 製劑具較小的分子量及低取代基比例，甚至將其溶解於與血漿可適應之平衡溶液中，更進一步改善其在腎臟及血液凝固方面的安全性，雖然仍需更多的使用經驗，但只要小心使用仍是改善低血容量時的好選擇。

參考資料：

1. Boldt J. Modern rapidly degradable hydroxyethyl starches: current concepts. *Anesth Analg.* 2009;108(5):1574-1582.
2. Haynes GR, Havidich JE, Payne KJ. Why the Food and Drug Administration changed the warning label for hetastarch. *Anesthesiology.* 2004;101(2):560-561.
3. Kozek-Langenecker SA, Jungheinrich C, Sauermann W, Van der Linden P. The effects of hydroxyethyl starch 130/0.4 (6%) on blood loss and use of blood products in major surgery: a pooled analysis of randomized clinical trials. *Anesth Analg.* 2008;107(2):382-390.
4. Wiedermann CJ. Systematic review of randomized clinical trials on the use of hydroxyethyl starch for fluid management in sepsis. *BMC Emerg Med.* 2008;8:1.
5. Boldt J, Brosch C, Rohm K, Papsdorf M, Mengistu A. Comparison of the effects of gelatin and a modern hydroxyethyl starch solution on renal function and inflammatory response in elderly cardiac surgery patients. *Br J Anaesth.* 2008;100(4):457-464.
6. Lehmann GB, Asskali F, Boll M, et al. HES 130/0.42 shows less alteration of pharmacokinetics than HES 200/0.5 when dosed repeatedly. *Br J Anaesth.* 2007;98(5):635-644.

IV. 新藥進用：

37 次藥事委員會通過品項(葉明欽總藥師整理)

一、A000013454 Metoclopramide Inj 7.68mg/2ml/amp (Promeran)。適應症：預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。 Bar code：13454
二、A000013214 複方製劑 Pancrelipase 280mg/cap (Protease)。適應症：囊腫性纖維化疾病、慢性胰臟炎、胰臟切除、胃腸鏡道手術及因腫瘤引發胰管式膽管阻塞等疾病所導致的胰液分泌不全。限腸胃科及一般外科使用。 Bar code：13214
三、A0000016349 Insulin glargine Inj 100IU/ml, 3ml/vial (Lantus)。適應症：糖尿病。 Bar code：16349
四、A0000016350 複方製劑 Glimepiride 2mg + Metformin HCl 500mg/tab (Amaryl M)。適應症：治療以 glimepiride 或 metformin 單一藥物療法仍無法達到適當的血糖控制之第二型糖尿病患者，作為飲食和運動之外的輔助。不適合作第一線治療。 Bar code：16350
五、A000006241 Clopidogrel 75mg tab (商品名 Thrombifree)。適應症：降低近期發生中風、心肌梗塞或週邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化病人之粥狀動脈硬化事件(如：心肌梗塞、中風或其他因血管病變引起的死亡)的發生。與 aspirin 併用降低非 ST 段上升之急性冠心症(不穩定性心絞痛和非 Q 波型心肌梗塞)病人之粥狀動脈栓塞事件。與 aspirin 併用可用於以內科治療的 ST 段上升之急性心肌梗塞病人。比照 Plavix 限科使用。 Bar code：06241
六、A000007335 複方製劑 Dipyridamole 200 mg + ASA 25mg modified release cap (Aggrenox)。適應症：用於曾因血栓引起腦部短暫缺血或完全缺血中風病人、減少中風之再復發。限心臟內科、心臟外科、神經內科、神經外科及復健科使用。 Bar code：07335
七、A000007056 Nifedipine 20mg Retard tab (Nifehexal Retard)。適應症：狹心症、高血壓。限兒醫部使用。 Bar code：07056
八、A000007057 複方製劑 Amlodipine 5mg + Valsartan 80mg Tab (Exforge)。適應症：成人原發性高血壓(作為第二線用藥)。 Bar code：07057
九、A000007133 Simvastatin 20mg/tab (Simvahexal)。適應症：高膽固醇血症，高三酸甘油脂血症，降低冠心病高危險群或冠心病患者的心血管事件發生率及冠心病致死率。限兒醫部使用。 Bar code：07133

<p>十、A000020360 Metronidazole Gel 0.75% 15gm/tube (MetroGel)。適應症：由酒渣鼻引起發炎性丘疹、膿疱及紅腫。 Bar code：20360</p>
<p>十一、A000020356 Betamethasone Dipropionate 0.064% Sol 10gm/bot (Septon)。適應症：濕疹、皮膚炎群(進行性指掌角皮症，包含威達耳氏(Vidal's)苔癬)、乾癬、掌蹠膿疱症、紅皮症。 Bar code：20356</p>
<p>十二、A000020357 複方製劑 Cinchocaine HCl 5mg + Hydrocortisone 5mg /pill suppositories (Proctosedyl)。適應症：痔瘡、肛門周圍炎、肛門龜裂。 Bar code：20357</p>
<p>十三、A000021165 Sildenafil 20mg/tab (Revatio)。適應症 肺動脈高血壓(WHO Group I)之治療以改善運動能力。限兒醫部使用。 Bar code：21165H</p>
<p>十四、A000020358 Silver Sulfadiazine Cream 400gm/bot, 1%, 10mg/gm (Silver Sulfadiazine)。適應症：熱傷感染之預防及治療(特別是革蘭氏陰性細菌感染症、例如綠膿桿菌感染症)其他刀傷、外傷、創傷、傷口感染之預防及治療。 Bar code：20358</p>
<p>十五、A000003228 Fluconazole 50mg/cap (Fluene)。適應症：念珠菌局部或全身感染，囊球菌感染，預防後天免疫缺乏症候群病人的黴菌感染。限兒醫部使用。 Bar code：03228</p>
<p>十六、A000003229 Anidulafungin Inj 100mg/vial (Eraxis)。適應症：治療非白血球低下之成人念珠菌血症，念珠菌腹膜炎及念珠菌腹腔內膿瘍。比照 Cancidas 限科使用。 Bar code：03229</p>
<p>十七、A000003720 複方製劑 Rifampicin 300mg + Isoniazide 150mg /cap (Rina)。適應症：結核症(肺結核、支氣管結核、腎結核及其他結核桿菌引起之結核症)。 Bar code：03720</p>
<p>十八、A000004219 Epirubicin HCl Inj (Epicin Lyo) 10mg/vial。適應症：乳腺癌、惡性淋巴瘤、軟組織肉瘤、胃癌、肺癌、卵巢瘤。 Bar code：04219</p>
<p>十九、A000004220 Epirubicin HCl Inj (Epicin Lyo) 50mg/vial 兩種規格。適應症：乳腺癌、惡性淋巴瘤、軟組織肉瘤、胃癌、肺癌、卵巢瘤。 Bar code：04220</p>
<p>二十、A000016151 複方製劑 Estradiol valerate 1mg + Medroxyprogesterone acetate 2.5mg/tab (Indivina)。適應症：停經婦女雌激素不足所引起之諸症狀。 Bar code：16151</p>
<p>二十一、A000004317 Triptorelin P.R. Inj 11.25mg/vial (Diphereline)。適應症：攝護腺癌以及子宮內膜異位症之輔助療法。限泌尿外科使用。</p>

<p>Bar code : 04317</p>
<p>二十二、A000009074 Ketorolac Tromethamine Inj 30mg/ml/amp (Laston)。適應症：短期(≤ 5 天)使用於緩解無法口服病人之中重度急性疼痛，通常使用於手術後。比照 Ketorolac Inj (Yung Shin) 限科使用。</p> <p>Bar code : 09074</p>
<p>二十三、A000008229 Fentanyl Patch, 12ug/h (Durogesic)。適應症：需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。第二級管制藥品。</p> <p>Bar code : 08229</p>
<p>二十四、A000008230 Buprenorphine 0.2mg sublingual tab (Temgesic)。適應症：緩解中、重度疼痛。第三級管制藥品。</p> <p>Bar code : 08230</p>
<p>二十五、A000008379 Quetiapine fumarate 200mg/tab (Utapine)。適應症：精神分裂症、雙極性疾患之躁症發作。比照 Seroquel 限科使用。</p> <p>Bar code : 08379</p>
<p>二十六、A000008545 Oxazepam 15mg/tab (Alepan)。適應症：焦慮狀態。第四級管制藥品。</p> <p>Bar code : 08545</p>
<p>二十七、A000008546 Buspirone HCl 5mg/tab(Sepirone)。適應症：焦慮狀態。</p> <p>Bar code : 08546</p>
<p>二十八、A000012073 Dextromethorphan hydrobromide SR 60mg/tab(Detosiv)。適應症：解除急性、慢性咳嗽症狀。</p> <p>Bar code : 12073</p>
<p>二十九、A000020139 Ofloxacin otic solution 5ml/bot, 3mg/ml (Earflo)。適應症：成人及小兒外耳炎，成人及青少年鼓膜穿孔之慢性中耳炎、裝有鼓膜造口管的小兒急性中耳炎。比照 Tarivid 限科使用。</p> <p>Bar code : 20139</p>
<p>三十、A000020359 Policrosulen Concentrate Solution 25ml/bot, 360mg/gm (Hygyn)。適應症：子宮頸糜爛、子宮頸炎、陰道炎、白帶、外陰搔癢、灼傷組織的清創、洗滌傷口。</p> <p>Bar code : 20359</p>
<p>三十一、A000007333 Cilostazol 100 mg/tab (Pletaal)。適應症：緩解間歇性跛足的症狀，如用於增加行走距離。限心臟內科及心臟血管外科使用。</p> <p>Bar code : 07333E</p>
<p>三十二、A000007266 Losartan potassium 50mg/tab (Zosaa)。適應症：高血壓，治療第 II 型糖尿病腎病變。</p> <p>Bar code : 07266H</p>

<p>三十三、A000007274 Losartan potassium 50mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg Tab (Hysartan)。適應症：高血壓。 Bar code：07274</p>
<p>三十四、A000005017 Cevimeline HCL 30mg/cap(Evoxac)。適應症：治療 Sjogren Syndrome 所引起的口乾症狀。比照 Salagen 限科使用。 Bar code：05017</p>
<p>三十五、A000013215 Bacillus mesentericus 10mg + Clostridium butyricum 10mg + Streptococcus faecalis 2mg Tab (Bio-Three)。適應症：緩解輕度腹瀉、腹痛及便秘、整腸(調整排便)、軟便。 Bar code：13125</p>
<p>三十六、A000007336 Dipyridamole 75mg/tab (Peysan)。適應症：對於慢性狹心症之治療可能有效。 Bar code：07336</p>
<p>三十七、A000003230 Clotrimazole Cream 20gm/tube 10mg/gm (Cansen)。適應症：皮黴菌、酵母菌屬、黴菌及真菌所引起之皮黴菌病、皮黴菌之繼發感染病。 Bar code：03230</p>
<p>三十八、A000004412 Paclitaxel Inj 6mg/ml, 5ml/vial (Genetaxyl Crem Less)。適應症：晚期卵巢癌、腋下淋巴轉移之乳癌，作為接續含杜薩魯比辛(Doxorubicin)在內之輔助化學療法、已使用合併療法(除非有禁忌，至少應包括使用 Anthracycline 抗癌藥)失敗的轉移乳癌、非小細胞肺癌、愛滋病相關卡波西氏肉瘤之第二線療法。 Bar code：04412H</p>
<p>三十九、A000008611 Pramipexole 1mg/tab (Mirapex)。適應症：治療自發性巴金森氏症的徵候及症狀、治療原發性腿部躁動症(Primary Restlesslegs Syndrome)的症狀。 Bar code：08611</p>
<p>四十、A000021149 Benzarone 100mg/tab (Fragivix)。適應症：痔瘡、靜脈腫瘤。 Benzarone 100mg/tab (Fragivix)。限大腸直腸外科使用。 Bar code：21149</p>