

耐絞寧舌下錠衛教單張

| 學名 | 中文名 | 商品名 | 含量 |
|---------------|------|-----------|---------|
| Nitroglycerin | 耐絞寧錠 | Nitrostat | 0.6mg/錠 |



心絞痛的原因

心絞痛主要是冠狀動脈因為阻塞造成血流減少，導致心肌缺氧。

心絞痛的症狀



胸悶、喘不過氣



頭痛



盜汗



疲憊

疼痛一般持續約 **2~5 分鐘** 左右，最長不超過 20 分鐘。

耐絞寧錠使用時機及用法

胸悶、喘不過氣時

先坐下

然後含一粒在舌下



第 1 粒



5 分鐘

沒緩解



第 2 粒



5 分鐘

沒緩解



第 3 粒



5 分鐘

沒緩解




第 3 顆無效後打 119

保存方式



原瓶避光保存
勿分裝



放包包隨身攜帶
避免高溫、曝曬
避免潮濕環境



一旦離開醫院，無論有無開封，
保存期限皆為 **6 個月**

常見的副作用

頭痛、臉潮紅、低血壓、心跳快、口乾、視力模糊
(若症狀持續出現請立即回診就醫)

用藥後若舌頭有
燒灼感、刺痛感，
此為**正常現象**，
不須擔心。

其他注意事項

- 1.若您曾因使用硝酸甘油製劑而發生藥物不良反應，請先告知醫師。
- 2.用藥後應避免機械操作、開車等需集中注意力之工作以避免危險。
- 3.請勿與壯陽藥物同時使用，若有用藥需求請先諮詢醫療人員。
- 4.易口乾者，會使舌下錠不易溶解，可使用人工唾液或嚼口香糖刺激唾液分泌。