

小朋友腹瀉用藥須知



腹瀉介紹：

1. 定義：

腹瀉是指小朋友排便次數比平常多或解水樣大便。持續腹瀉會導致脫水、電解質不平衡。

2. 腹瀉常見的原因：

(1) 腸道感染：
病毒、細菌、原蟲感染。



(2) 腸道發炎：
例如潰瘍性結腸炎。



(3) 飲食：
食物過敏、牛奶蛋白質過敏、乳糖不耐症、食物中毒。



(4) 藥物：
長期服用抗生素影響腸內正常菌叢生長。



3. 臨床治療：

1



依醫師指示
補充口服
電解質液

2



打點滴
補充
體液
電解質

3



依醫師指示使
用止瀉藥、整
腸藥或抗生素

4

藥物治療

詳情請見背面說明。



4. 何時該找醫師協助

如果小朋友持續腹瀉、嘴唇乾裂、小便減少、糞便帶血、發燒伴隨抽搐、精神狀況或活力變差等，應趕快送醫就診。



□ 1. 舒腹達口服懸液-用粉劑: Smecta

用法:

1 藥粉可與開水或與半流質: 果汁、肉湯、嬰兒食品...混合

一袋泡西
每次喝西



2 將藥粉與水混合均勻

3 依指示單次或分多次服用


儲存: 泡製完成後的藥物必須置於冷藏, 且只能放置一天, 若當天未使用完畢則需丟棄。

★注意

此藥可能干擾其他藥物的吸收、排除, 因此兩者需間隔至少2小時。
此藥不能替代補充液療法, 脫水病人應依醫生指示補充水分或電解質。
連續服用七天未改善或有疼痛、發燒、嘔吐, 應告知醫師。
小於兩歲不適服用

□ 2. 嬰兒瀉必寧10毫克懸浮液-用顆粒劑: Hidrasec

用法:



或



此顆粒劑可加入少量水(置於茶匙中)或食物中充分混合後立即服用

★注意

因藥品內含有蔗糖。果糖不耐症、葡萄糖/半乳糖吸收不良症候群、蔗糖/異麥芽糖酶缺乏症(sucrose- isomaltase insufficiency) 之罕見遺傳性疾患者, 請勿服用。

□ 3. 高克痢懸浮液: Pecolin

每次喝西

用法:



使用前請先振搖均勻

儲存: 開封後一個月後丟棄

★注意

請與其他藥物間隔2-3小時服用, 服用後糞便呈現灰白色為正常現象。
小於三歲, 請在醫師、藥師指示下使用。

Image: irasutoya.com, Flaticon.com