

Pecolin Suspension

編號：12

【學名】：Kaolin +pectin

【商品名】：Pecolin Suspension

【中文商品名】：高克痢懸乳液

【作用】：暫時緩解輕微或中度急性腹瀉

【用法】：

1. 請遵照醫師處方之用法及劑量服用，勿擅自更改服用方式。
2. 若醫師無特別指示，建議飯前服用本藥，並與其他藥物間隔 2~3 小時。

【注意事項】

1. 服用本藥前須先振搖均勻。
2. 若您已知對此藥物過敏，請務必告知醫師。
3. 若您的腹瀉伴隨發燒或有血便的情形，請勿使用本藥止瀉，並請盡速就醫。
4. 治療期間需注意病患是否有因腹瀉造成過度脫水現象，如：排尿減少、暈眩、口乾、皮膚出現皺摺等狀況。
5. 服藥2-3天後若腹瀉狀況仍無改善，請立即回診就醫。
6. 非醫師或藥師指示，孕婦及授乳婦不建議自行服用。

【副作用】

本藥較少見嚴重副作用。若因服用本藥產生不適請立即回診。大量或長期服用本藥可能會引起便秘，當已無腹瀉情形即可停藥。

【建議事項】

1. 除非藥品另有標示使用期限外，一般效期為開處方期限後三個月。
2. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
3. 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤用。
4. 不可將本藥與他人分享，以免發生危險。

此教育單張並未包含本藥所有的資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。諮詢電話 06-3125101 轉 1203
高雄榮民總醫院臺南分院藥劑科製