

Amiodarone

編號：2

【主成分】：Amiodarone 200mg／錠

【商品名】：Cordarone

【中文名】：臟得樂

【作用】預防及治療不規則心跳（心律不整）。

【用法】

1. 請嚴格遵守醫師指示的用法及劑量規律服藥。切不可自行調整劑量，即使您覺得病情有所改善，亦勿自行停藥。
2. 本藥可在餐前、用餐中或餐後服用，與食物併服，可以避免腸胃不適的現象。

【注意事項】

1. 懷孕中或正在哺乳、或曾對此藥產生過敏反應，及有肺、肝或甲狀腺的疾病，請告訴您的醫師。
2. 若您同時併用下述藥品：Phenytoin (Dilantin), Coumadin, 心臟用藥 (Digoxin, Inderal, Tenormin, Cardizem, Adalat), 或利尿劑 (Hydrochlorothiazide) 時，請務必告知您的醫師，以避免發生嚴重之藥物交互作用。
3. 在您併服任何藥物之前，請先諮詢您的醫師或藥師。
4. 服用本藥時，請勿吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。
5. 在接受任何手術前，請先告知您的醫師或牙醫師，您正在服用本藥。
6. 本藥會使皮膚產生對光敏感的現象，故在戶外時請注意防曬。
7. 服用本藥數個月後，您的皮膚可能會呈現藍灰色情形，特別是經常暴露在陽光下的皮膚。

【副作用】

※若您於服藥後發生下述狀況，請儘速就醫：

心律不整、超過15分鐘以上的胸痛、呼吸急促或呼吸困難、咳嗽、發燒、紅疹、震顫、步行困難、疲倦、虛弱

※若您於服藥後發生下述狀況，請告知醫師：頭痛、頭暈、視覺模糊、藍綠色的視覺反應、皮膚及眼睛對光敏感、噁心、嘔吐、便秘、缺乏食慾、體重減輕、具金屬味覺及鹹味感、性慾減低

【忘記服藥】

忘記服藥時請儘快補服；但若已很接近下次的服藥時間時，則請跳過一次劑量，待下次正確之服藥時間到時再行服藥；請勿一次服用兩倍劑量

此教育單張並未包含本藥所有的資訊，若您仍有其他相關問題，

請詢問您的醫師或藥師。諮詢電話 06-3125101 轉 1203

高雄榮民總醫院臺南分院藥劑科製