

# 制酸劑藥品使用須知

編號：16

## 【作用】

制酸劑即俗稱之胃藥，成分以含鋁或(及)鎂之化合物為主，主要作用在於中和胃酸，用以緩解或預防因為胃酸過多所引起的心口灼熱感、胃脹氣或消化不良的症狀，也可用來治療或預防潰瘍的發生。

## 【服藥方式】

1. 請遵照醫師或藥師指示服藥。一般建議於飯後一小時內服用，可維持約三小時藥效。
2. 咀嚼錠必須嚼碎後，並喝下適量的水再行吞服；胃乳於使用前請振搖均勻。

## 【注意事項】

1. 應按時回診，若您服用此藥已超過一週以上，而疼痛未解除，則請聯絡醫師。
2. 服用含鎂制酸劑(如氧化鎂)可能造成腹瀉；含鋁制酸劑可能造成便秘。
3. 制酸劑會影響許多藥品之吸收，可能造成藥品作用降低或使病情失控，如：強心劑、抗生素(如抗黴菌劑)、鐵劑及某些抗潰瘍劑，如無法避免併服時，應先服用其它藥品，於二小時後再服用胃藥，或者詢問醫師或藥師。
4. 請將本藥連同藥袋置室溫之陰涼乾燥處避光儲存，胃乳請勿冷藏以免影響其均勻度，請勿放在孩童可以取得的場所。

## 【副作用】

可能發生的症狀：食慾減退、腹瀉、便秘、疲勞、味覺不佳。若症狀持續數日或嚴重時，請停藥 或與醫師聯繫。

## 【忘記服藥時該怎麼辦】

若忘記服藥，則於想起時儘快服用；若想起時已接近下次服藥時間，則不必補服，於下次的服藥時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

## 【懷孕或哺乳時該怎麼辦】

在正常情況下，鎂與鋁離子幾乎不吸收，僅停留在腸胃道再從糞便排出，安全性較高，如經醫師評估後須使用，可適用於孕婦；重碳酸鈉及碳酸鈣之中和能力強但安全性較低，須經醫師評估，才決定使用與否。

此教育單張並未包含本藥所有的資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。諮詢電話 06-3125101 轉 1203  
高雄榮民總醫院臺南分院藥劑科製