

Propranolol

編號：13

【英文商品名】Propranolol Tab. 10mg

【中文商品名】心律錠 10 公絲

【作用】

治療高血壓、心絞痛、心律不整、偏頭痛。

【用法】

每日服用次數及每次劑量請遵照醫師指示。

【注意事項】

1. 會引起頭暈目眩及視覺模糊的副作用，尤其是剛開始服藥期間，除非已經適應了此藥的作用，當開車或操作危險機械時，應該格外小心謹慎。
2. 如有下列情形：曾對此藥過敏；有心臟、腎臟或肝臟等疾病；或有氣喘、氣管炎、肺氣腫等；或糖尿病、甲狀腺機能亢進，請事先告知醫師。
3. 請事先告知醫師您目前正在服用的藥物，尤其是心臟病、高血壓、糖尿病、氣喘、過敏、偏頭痛、精神病或感冒方面的藥品。
4. 每天定時測量脈搏速率，若低於醫師所訂定的標準，請馬上與醫師聯繫，再決定今天是否服藥。
5. 身邊要維持足夠的藥量，尤其在假日或長途旅行之前，藥量須先補足。
6. 請配合低鈉、低鹽飲食及適量運動，並且戒菸、戒酒。
7. 因突然停藥可能會導致病情惡化，未經醫師許可請勿擅自停藥。
8. 服藥期間若接受外科手術(包括牙科手術)，請事先告知醫師您正在服用此藥。

【副作用】

1. 常見的副作用為：便秘、噁心、腹瀉、嘔吐、精神緊張、疲倦、頭痛、頭暈、手腳冰冷、睡不好、惡夢、精神異常等等。
2. 嚴重的副作用為：呼吸困難、哮喘、下肢水腫、胸痛、脈搏變慢或不規則、昏倒等等。如果發生時，應該儘快通知醫師。

【忘記服藥時該怎麼辦】

如果忘記服藥，應該在記起時，立即服用。如果距離下次服藥的時間太近，直接跳到下次正常服藥的時間。如果遺忘超過兩次劑量，就應該通知醫師。

【懷孕或哺乳時該怎麼辦】

孕婦或授乳婦女禁止使用此藥。因此在服藥期間，如果發現已懷孕，就應該立即停止服用，並且儘快通知醫師。授乳婦女，最好能改用其他的乳製品以取代母乳。

此教育單張並未包含本藥所有的資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。諮詢電話 06-3125101 轉 1203
高雄榮民總醫院臺南分院藥劑科製