

Dipyridamole

編號：7

學名	商品名	中文商品名
Dipyridamole	Dipyridamole Tab 25 mg	待匹力達糖衣錠25公絲
	Peysan 75mg F.C.Tab	沛暢膜衣錠 75 公絲

【用法】 請確實依照醫師指示使用，不可任意突然停藥。

【注意事項】

1. 建議應空腹服用。
2. 若同時有服用其他藥物如止痛消炎藥或抗凝血藥物請主動告知醫師或藥師。
3. 應將藥品保存於陰涼乾燥及孩童無法取得的地方，避免陽光照射及潮濕。
4. 請勿讓他人服用您的藥品。

【副作用】

1. 可能會有頭暈、頭痛或低血壓的症狀，應避免開車或操作重型機械。
2. 若有紅疹或癢，可能是藥物過敏的現象，請先停止服用本藥再與醫師連絡或就診。

【忘記服藥時該怎麼辦】

忘記服藥時，若馬上想起時請立即服用；但已超過應服藥時間12小時，則不要補服，請至下一次應服藥時間才服用當次應服用劑量(不可將兩次劑量併服)；如果漏掉2天以上的劑量，請告知醫師。

【懷孕或哺乳時該怎麼辦】

孕婦、計劃懷孕或授乳的婦女，請於開始服藥前告知醫師。若於服藥期間懷孕，請務必告知您的醫師，醫師將就其危險與益處加以評估，而決定續用與否。

此教育單張並未包含本藥所有的資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。諮詢電話 06-3125101 轉 1203
高雄榮民總醫院臺南分院藥劑科製