

Aspirin (Acetylsalicylic acid)

編號：4

學名	商品名	中文商品名
Aspirin	Ascotyl EM	暢血脈 100 公絲
	Aspirin protect	阿斯匹林腸溶膜衣錠100公絲

【作用】解熱、鎮痛、緩解發炎反應及預防心肌梗塞。

【用法】請確實遵照醫師處方用藥。

【注意事項】

1. 對本類藥品或其他解熱鎮痛藥過敏者，請先告知醫師。
2. 服藥期間應避免喝酒。
3. 正在服用其他藥品，如：抗凝血劑等，請先告知醫師。
4. 有心衰竭、高血壓、水腫、氣喘、消化性潰瘍、嚴重肝腎功能障礙等病史者，請先告知醫師。
5. 服用本藥期間，須進行拔牙或各類手術時，應告知醫師。
6. 未經醫師指示，請勿任意停止服用此藥或自行調整劑量。
7. 蠶豆症(G6PD 缺乏)患者不得服用本類藥品。
8. Aspirin可能與一種罕見但嚴重之疾病－雷氏症候群 (Reye's syndrome)有相關性。除少數病外，不建議用於兒童或 20 歲以下之青少年之水痘或流行性感感冒症狀之緩解。

【副作用】

1. 嚴重腹痛、吐血、血便、搔癢、蕁麻疹、臉、手、喉嚨腫大及刺痛、胸悶、呼吸困難、嚴重頭暈、嗜睡、耳鳴，請立刻至急診就醫。
2. 胃痛或胃灼熱、噁心、嘔吐 → 若症狀持續請儘快就醫。

【忘記服藥時該怎麼辦】

若忘記用藥，則於想起時儘快使用，若想起時已接近下次用藥時間，則不需補服，按原時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

【懷孕或哺乳時該怎麼辦】

懷孕：懷孕第三期應避免使用此類藥品。

懷孕第一、二期只有在醫師嚴密評估過用藥危險及效益後，才能使用。哺乳：本藥會有少量分泌於乳汁中，長期使用高劑量salicylate(每天大於 300 毫克)的母親應停止授乳，因為無法排除可能對新生兒造成的危險性。

此教育單張並未包含本藥所有的資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。諮詢電話 06-3125101 轉 1203
高雄榮民總醫院臺南分院藥劑科製