

Amlodipine

編號：3

學名	商品名	中文商品名
Amlodipine	Norvasc 5mg	脈優錠 5 公絲
	Nobar Tab. 5 mg	諾怡錠

【作用】 單獨或與其他藥品合併使用於高血壓、胸痛(心絞痛)。

【用法】 請遵照醫師或藥師指示服藥，一般服藥次數為每日 1 次。

【注意事項】

1. 若您正在服用其他藥品來治療您的高血壓，應告知您的醫師。
2. 服用本劑期間請勿飲酒，葡萄柚汁及葡萄柚。
3. 若您正在服用其他藥品包括非處方藥、維他命及草藥製品請詢問藥師或醫師。
4. 確認您的醫師知道您正在懷孕或授乳。
5. 確認您的醫師知道您有心臟疾病、肝臟疾病、胃疾病或主動脈狹窄。
6. 若您覺得病況改善欲停用本劑則必須慢慢降低劑量，切勿未告知醫師自行突然停止服用本劑。
7. 可能發生嗜睡、暈眩及頭昏眼花等現象請小心開(騎)車或操作機器。
8. 請連同藥袋將本劑置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存。請勿放在兒童可以取得的場所。
9. 請勿讓他人服用您的藥品。

【副作用】

1. 若發生下列症狀請立即連絡醫師：胸痛(可能與您的疾病有關而非副作用)；尿液呈暗黃色；心跳快、不規律或重擊感；足踝或腳腫脹、眼睛或皮膚變黃、經常覺得疲倦或虛弱。
2. 若發生下列較不嚴重的副作用症狀請與告知您的醫師：潮紅且會覺發熱；頭痛；噁心或胃不舒服。
3. 若有其他的副作用您覺得可能與本劑有關請與您的醫師討論。

【忘記服藥時該怎麼辦】

當您記起來的時候，趕快補服一次劑量。但是若接近下次服藥時間，則跳過不須補服。不可同時服用兩次劑量。

【懷孕或哺乳時該怎麼辦】

本劑除非必要，否則懷孕婦女最好不要使用。本劑會分泌於乳汁，授乳婦女應小心使用。

此教育單張並未包含本藥所有的資訊，若您仍有其他相關問題，

請詢問您的醫師或藥師。諮詢電話 06-3125101 轉 1203

高雄榮民總醫院臺南分院藥劑科製