

定量噴霧吸入劑(MDI)

編號：21

| 商品名 | 成分名 | 中文商品名 |
|-------------------|---|---------------|
| Berotec MDI | Fenoterol hydrobromide 4mg/ml 200 劑量 / 15ml / 瓶 | 備勞喘 定量噴霧液 |
| Seretide Evohaler | Salbutamol sulphate 250µg + Fluticasone 250ug 200 劑量 / 10ml / 瓶 | 使肺泰 250 優氟吸入劑 |

【作用】支氣管擴張劑，在氣管收縮呼吸困難時，用來擴張氣管，緩解症狀。

【操作流程】


1. 移去吸口端蓋子，並提持噴霧劑，大力搖勻。




2. 手持噴霧劑，徐徐呼氣(不必完全呼出)，然後立即採用下列兩個方法擇一使用。




3. (a)：口含式：頭稍微向後仰，將吸口端含於口中以嘴唇含緊，由口徐徐吸氣，同時將噴霧劑穩定的按下。



- (b)：離口式頭稍微向後仰，口張開，將吸口端至於口前 2 公分處，由口徐徐吸氣，同時將噴霧劑穩定的按下。



4. 停止呼吸十秒或用力屏息後緩慢呼出。



5. 如需第二次吸入，至少在一分鐘後再依上述步驟施行。
6. 使用後將吸口端蓋子蓋好。

【注意事項】：

1. 使用前務必充分振搖，因為藥物存在懸浮液中所以顆粒會沉澱，使用前搖晃噴霧劑，才能準確釋出定量的藥物。
2. 噴射時，容器底部應朝上，吸氣和噴射的動作應同時進行，使得藥物能順利藉由吸氣到達肺部。
3. 使用時如需第二次吸入，須個流程完成後間隔 30 秒~1 分鐘，再進入第二次吸入，若噴藥間隔不夠長，吸入劑量可能不準確或者藥物無法滲透至肺部。
4. 噴嘴部分和含口器應經常用水沖洗以避免阻塞。
5. 遵守“呼—吸—屏息”三原則，才可達到有效治療效果。

此教育單張並未包含本藥所有的資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。諮詢電話 06-3125101 轉 1203
高雄榮民總醫院臺南分院藥劑科製